

表 1611 喫煙の有無 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析後体重	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満	56	10	66	4	14	84
(%)	(84.8)	(15.2)	(100.0)			
20～	621	17	638	30	134	802
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
30～	14,662	604	15,266	925	2,926	19,117
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
40～	43,663	3,555	47,218	3,078	9,513	59,809
(%)	(92.5)	(7.5)	(100.0)			
50～	49,345	7,023	56,368	4,088	11,653	72,109
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
60～	28,805	5,600	34,405	2,625	7,052	44,082
(%)	(83.7)	(16.3)	(100.0)			
70～	10,716	2,665	13,381	1,046	2,757	17,184
(%)	(80.1)	(19.9)	(100.0)			
80～	3,685	1,080	4,765	375	941	6,081
(%)	(77.3)	(22.7)	(100.0)			
90～	1,251	431	1,682	160	353	2,195
(%)	(74.4)	(25.6)	(100.0)			
100～	432	156	588	52	115	755
(%)	(73.5)	(26.5)	(100.0)			
110～	178	55	233	18	48	299
(%)	(76.4)	(23.6)	(100.0)			
120～	101	44	145	8	36	189
(%)	(69.7)	(30.3)	(100.0)			
合計	153,515	21,240	174,755	12,409	35,542	222,706
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
記載なし	1,760	193	1,953	598	3,714	6,265
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
総計	155,275	21,433	176,708	13,007	39,256	228,971
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
平均	54.61	60.81	55.37	56.39	55.50	55.45
標準偏差	12.62	13.57	12.90	12.95	12.85	12.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査