

表 1645 喫煙の有無 体重減少量(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	75 (93.8)	5 (6.3)	80 (100.0)	7	10	97
0.0～ (%)	942 (90.7)	97 (9.3)	1,039 (100.0)	66	215	1,320
1.0～ (%)	5,377 (91.8)	482 (8.2)	5,859 (100.0)	384	1,157	7,400
2.0～ (%)	10,336 (89.1)	1,266 (10.9)	11,602 (100.0)	809	2,243	14,654
3.0～ (%)	5,244 (82.2)	1,136 (17.8)	6,380 (100.0)	438	1,196	8,014
4.0～ (%)	1,294 (74.2)	450 (25.8)	1,744 (100.0)	138	309	2,191
5.0～ (%)	223 (69.5)	98 (30.5)	321 (100.0)	19	60	400
6.0～ (%)	30 (65.2)	16 (34.8)	46 (100.0)	1	12	59
7.0～ (%)	10 (83.3)	2 (16.7)	12 (100.0)	2	2	16
8.0～ (%)	22 (88.0)	3 (12.0)	25 (100.0)	1	4	30
合計 (%)	23,553 (86.9)	3,555 (13.1)	27,108 (100.0)	1,865	5,208	34,181
記載なし (%)	110 (88.0)	15 (12.0)	125 (100.0)	51	614	790
総計 (%)	23,663 (86.9)	3,570 (13.1)	27,233 (100.0)	1,916	5,822	34,971
平均	2.51	2.95	2.57	2.61	2.54	2.57
標準偏差	0.99	1.09	1.02	1.15	1.06	1.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査