

表 1670 喫煙の有無 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	1,677 (91.8)	150 (8.2)	1,827 (100.0)	258	974	3,059
慢性腎盂腎炎 (%)	67 (97.1)	2 (2.9)	69 (100.0)	4	20	93
急速進行性糸球 体腎炎 (%)	39 (95.1)	2 (4.9)	41 (100.0)	6	27	74
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)	27 (100.0)		27 (100.0)	2	3	32
その他の分類不能 の腎炎 (%)	54 (96.4)	2 (3.6)	56 (100.0)	2	27	85
多発性嚢胞腎 (%)	130 (90.9)	13 (9.1)	143 (100.0)	23	77	243
腎硬化症 (%)	582 (93.7)	39 (6.3)	621 (100.0)	123	339	1,083
悪性高血圧 (%)	53 (89.8)	6 (10.2)	59 (100.0)	8	40	107
糖尿病性腎症 (%)	1,371 (87.3)	199 (12.7)	1,570 (100.0)	221	975	2,766
SLE腎炎 (%)	34 (87.2)	5 (12.8)	39 (100.0)	2	21	62
アミロイド腎 (%)	4 (100.0)		4 (100.0)		5	9
痛風腎 (%)	16 (80.0)	4 (20.0)	20 (100.0)	3	10	33
先天性代謝異常に よる腎不全 (%)	11 (91.7)	1 (8.3)	12 (100.0)	2	4	18
腎・尿路結核 (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
腎・尿路結石 (%)	11 (100.0)		11 (100.0)	1	4	16
腎・尿路腫瘍 (%)	8 (100.0)		8 (100.0)	1	5	14
閉塞性尿路障害 (%)	11 (78.6)	3 (21.4)	14 (100.0)		8	22
骨髄腫 (%)	5 (100.0)		5 (100.0)		3	8
腎形成不全 (%)	48 (94.1)	3 (5.9)	51 (100.0)	4	21	76
不明 (%)	443 (91.9)	39 (8.1)	482 (100.0)	55	303	840
再導入 (%)	26 (86.7)	4 (13.3)	30 (100.0)	1	20	51
その他 (%)	126 (91.3)	12 (8.7)	138 (100.0)	18	93	249
合計 (%)	4,744 (90.7)	484 (9.3)	5,228 (100.0)	734	2,979	8,941
記載なし (%)						
総計 (%)	4,744 (90.7)	484 (9.3)	5,228 (100.0)	734	2,979	8,941

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査