

表 1674 喫煙の有無 体重(kg)別 (腹膜透析患者)

体重	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	38 (100.0)		38 (100.0)			38
20~ (%)	23 (100.0)		23 (100.0)			23
30~ (%)	138 (94.5)	8 (5.5)	146 (100.0)	13	13	172
40~ (%)	726 (95.7)	33 (4.3)	759 (100.0)	74	71	904
50~ (%)	1,184 (92.1)	101 (7.9)	1,285 (100.0)	165	141	1,591
60~ (%)	1,138 (88.8)	143 (11.2)	1,281 (100.0)	181	154	1,616
70~ (%)	541 (85.9)	89 (14.1)	630 (100.0)	97	84	811
80~ (%)	193 (82.1)	42 (17.9)	235 (100.0)	36	27	298
90~ (%)	58 (74.4)	20 (25.6)	78 (100.0)	10	16	104
100~ (%)	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)	4	4	20
110~ (%)	8 (100.0)		8 (100.0)		2	10
120~ (%)	4 (80.0)	1 (20.0)	5 (100.0)	3	1	9
合計 (%)	4,060 (90.2)	440 (9.8)	4,500 (100.0)	583	513	5,596
記載なし (%)	684 (94.0)	44 (6.0)	728 (100.0)	151	2,466	3,345
総計 (%)	4,744 (90.7)	484 (9.3)	5,228 (100.0)	734	2,979	8,941
平均	59.59	66.03	60.22	62.81	63.00	60.74
標準偏差	13.76	13.55	13.87	13.52	14.10	13.90

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査