

表 1708 腹膜透析の経験 PTH値(pg/mL)別（透析患者全体）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	なし	あり(年末時点でカテ テルあり)	あり(年末時点でカテ テルなし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	9,295 (95.5)	146 (1.5)	287 (3.0)	9,728 (100.0)	34	2,111	11,873
20～ (%)	13,178 (95.1)	323 (2.3)	354 (2.6)	13,855 (100.0)	55	3,036	16,946
40～ (%)	13,970 (95.1)	296 (2.0)	424 (2.9)	14,690 (100.0)	51	3,275	18,016
60～ (%)	14,856 (95.0)	362 (2.3)	425 (2.7)	15,643 (100.0)	53	3,534	19,230
80～ (%)	15,155 (95.0)	372 (2.3)	420 (2.6)	15,947 (100.0)	50	3,616	19,613
100～ (%)	14,617 (94.4)	370 (2.4)	505 (3.3)	15,492 (100.0)	36	3,630	19,158
120～ (%)	13,905 (94.6)	351 (2.4)	446 (3.0)	14,702 (100.0)	59	3,461	18,222
140～ (%)	12,893 (94.7)	309 (2.3)	419 (3.1)	13,621 (100.0)	36	3,150	16,807
160～ (%)	11,636 (94.5)	310 (2.5)	371 (3.0)	12,317 (100.0)	34	2,822	15,173
180～ (%)	26,309 (94.5)	717 (2.6)	815 (2.9)	27,841 (100.0)	68	6,604	34,513
240～ (%)	336 (93.3)	12 (3.3)	12 (3.3)	360 (100.0)	2	82	444
241～ (%)	14,995 (93.7)	469 (2.9)	532 (3.3)	15,996 (100.0)	36	3,807	19,839
300～ (%)	8,687 (93.1)	347 (3.7)	293 (3.1)	9,327 (100.0)	23	2,176	11,526
360～ (%)	5,023 (93.3)	196 (3.6)	164 (3.0)	5,383 (100.0)	5	1,296	6,684
420～ (%)	2,879 (91.8)	140 (4.5)	117 (3.7)	3,136 (100.0)	7	782	3,925
480～ (%)	723 (90.5)	42 (5.3)	34 (4.3)	799 (100.0)	2	163	964
500～ (%)	1,131 (91.3)	58 (4.7)	50 (4.0)	1,239 (100.0)	4	321	1,564
540～ (%)	1,258 (91.6)	69 (5.0)	47 (3.4)	1,374 (100.0)	1	339	1,714
600～ (%)	2,047 (91.2)	115 (5.1)	82 (3.7)	2,244 (100.0)	4	551	2,799
800～ (%)	1,583 (89.8)	111 (6.3)	69 (3.9)	1,763 (100.0)	9	390	2,162
合計 (%)	184,476 (94.4)	5,115 (2.6)	5,866 (3.0)	195,457 (100.0)	569	45,146	241,172
記載なし (%)	4,358 (90.3)	355 (7.4)	113 (2.3)	4,826 (100.0)	89	1,469	6,384
総計 (%)	188,834 (94.3)	5,470 (2.7)	5,979 (3.0)	200,283 (100.0)	658	46,615	247,556
平均	170.09	214.74	183.79	171.67	156.21	174.57	172.17
標準偏差	161.38	208.84	184.81	163.71	171.85	164.81	163.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査