

表 1710 腹膜透析の経験 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（透析患者全体）

透析前ヘモグロビン濃度	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
5未満	254	8	7	269	14	20	303
(%)	(94.4)	(3.0)	(2.6)	(100.0)			
5～	358	13	6	377	3	49	429
(%)	(95.0)	(3.4)	(1.6)	(100.0)			
6～	915	31	18	964	7	189	1,160
(%)	(94.9)	(3.2)	(1.9)	(100.0)			
7～	3,417	122	83	3,622	21	792	4,435
(%)	(94.3)	(3.4)	(2.3)	(100.0)			
8～	11,288	354	301	11,943	81	2,530	14,554
(%)	(94.5)	(3.0)	(2.5)	(100.0)			
9～	35,242	1,000	1,009	37,251	156	8,582	45,989
(%)	(94.6)	(2.7)	(2.7)	(100.0)			
10～	71,850	1,855	2,140	75,845	256	17,811	93,912
(%)	(94.7)	(2.4)	(2.8)	(100.0)			
11～	59,270	1,874	2,086	63,230	196	14,747	78,173
(%)	(93.7)	(3.0)	(3.3)	(100.0)			
12～	21,737	841	846	23,424	91	5,339	28,854
(%)	(92.8)	(3.6)	(3.6)	(100.0)			
13～	5,478	251	241	5,970	24	1,314	7,308
(%)	(91.8)	(4.2)	(4.0)	(100.0)			
14～	2,014	85	94	2,193	11	469	2,673
(%)	(91.8)	(3.9)	(4.3)	(100.0)			
合計	211,823	6,434	6,831	225,088	860	51,842	277,790
(%)	(94.1)	(2.9)	(3.0)	(100.0)			
記載なし	5,988	971	255	7,214	39	25,065	32,318
(%)	(83.0)	(13.5)	(3.5)	(100.0)			
総計	217,811	7,405	7,086	232,302	899	76,907	310,108
(%)	(93.8)	(3.2)	(3.1)	(100.0)			
平均	10.70	10.82	10.88	10.71	10.42	10.72	10.71
標準偏差	1.29	1.40	1.30	1.29	1.62	1.24	1.28

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査