

表 1735 腹膜透析の経験 %クレアチニン産生速度(%)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	なし	あり(年末時点でカテー テルあり)	あり(年末時点でカテー テルなし)	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	9,893 (97.7)	47 (0.5)	190 (1.9)	10,130 (100.0)	86	2,334	12,550
60～ (%)	7,132 (97.2)	34 (0.5)	174 (2.4)	7,340 (100.0)	38	1,747	9,125
70～ (%)	11,064 (97.1)	46 (0.4)	285 (2.5)	11,395 (100.0)	54	2,505	13,954
80～ (%)	15,438 (96.5)	81 (0.5)	474 (3.0)	15,993 (100.0)	69	3,621	19,683
90～ (%)	19,428 (96.0)	107 (0.5)	701 (3.5)	20,236 (100.0)	76	4,546	24,858
100～ (%)	20,664 (95.6)	131 (0.6)	823 (3.8)	21,618 (100.0)	66	4,911	26,595
110～ (%)	18,444 (95.2)	108 (0.6)	812 (4.2)	19,364 (100.0)	60	4,430	23,854
120～ (%)	13,386 (94.9)	70 (0.5)	654 (4.6)	14,110 (100.0)	39	3,189	17,338
130～ (%)	7,310 (94.7)	35 (0.5)	373 (4.8)	7,718 (100.0)	29	1,861	9,608
140～ (%)	4,983 (95.6)	22 (0.4)	209 (4.0)	5,214 (100.0)	18	1,217	6,449
合計 (%)	127,742 (96.0)	681 (0.5)	4,695 (3.5)	133,118 (100.0)	535	30,361	164,014
記載なし (%)	9,992 (96.2)	74 (0.7)	318 (3.1)	10,384 (100.0)	34	3,777	14,195
総計 (%)	137,734 (96.0)	755 (0.5)	5,013 (3.5)	143,502 (100.0)	569	34,138	178,209
平均	98.53	99.35	104.69	98.75	90.48	98.86	98.74
標準偏差	25.97	24.07	23.55	25.90	29.67	26.12	25.96

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査