

表 1766 腹膜透析の経験 nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	36 (100.0)			36 (100.0)		7	43
0.4～ (%)	905 (95.8)	5 (0.5)	35 (3.7)	945 (100.0)	1	184	1,130
0.6～ (%)	7,131 (95.5)	30 (0.4)	303 (4.1)	7,464 (100.0)	37	1,572	9,073
0.8～ (%)	11,608 (94.6)	58 (0.5)	601 (4.9)	12,267 (100.0)	47	2,566	14,880
1.0～ (%)	4,976 (93.3)	27 (0.5)	328 (6.2)	5,331 (100.0)	27	1,173	6,531
1.2～ (%)	888 (94.2)	8 (0.8)	47 (5.0)	943 (100.0)	4	220	1,167
1.4～ (%)	92 (88.5)	1 (1.0)	11 (10.6)	104 (100.0)		24	128
1.6～ (%)	10 (100.0)			10 (100.0)		3	13
1.8～ (%)	1 (100.0)			1 (100.0)			1
2.0～ (%)	3 (75.0)		1 (25.0)	4 (100.0)		2	6
合計 (%)	25,650 (94.6)	129 (0.5)	1,326 (4.9)	27,105 (100.0)	116	5,751	32,972
記載なし (%)	1,155 (96.5)	7 (0.6)	35 (2.9)	1,197 (100.0)	15	787	1,999
総計 (%)	26,805 (94.7)	136 (0.5)	1,361 (4.8)	28,302 (100.0)	131	6,538	34,971
平均	0.88	0.91	0.91	0.88	0.89	0.89	0.88
標準偏差	0.17	0.18	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査