

表 1961 血流量(ml/分) 体重減少率(%)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)	4 (0.1)	31 (0.9)	65 (1.8)	477 (13.1)	119 (3.3)	525 (14.5)	1,578 (43.5)	386 (10.6)	332 (9.1)	23 (0.6)	22 (0.6)	54 (1.5)	5 (0.1)	8 (0.2)	3,629 (100.0)	67	3,696	197.15	36.61
1.0～ (%)	2 (0.0)	20 (0.3)	62 (1.0)	685 (10.6)	204 (3.1)	961 (14.8)	2,889 (44.5)	770 (11.9)	668 (10.3)	56 (0.9)	55 (0.8)	101 (1.6)	5 (0.1)	14 (0.2)	6,492 (100.0)	117	6,609	200.94	34.90
2.0～ (%)	1 (0.0)	42 (0.3)	160 (1.0)	1,309 (7.9)	504 (3.0)	2,316 (13.9)	7,680 (46.1)	2,206 (13.2)	1,824 (10.9)	174 (1.0)	132 (0.8)	256 (1.5)	27 (0.2)	41 (0.2)	16,672 (100.0)	249	16,921	203.55	34.63
3.0～ (%)		49 (0.1)	190 (0.6)	2,133 (6.2)	879 (2.6)	4,468 (13.1)	15,498 (45.3)	5,046 (14.8)	4,329 (12.7)	403 (1.2)	378 (1.1)	664 (1.9)	62 (0.2)	83 (0.2)	34,182 (100.0)	402	34,584	207.04	34.36
4.0～ (%)	6 (0.0)	50 (0.1)	223 (0.5)	2,311 (5.0)	1,092 (2.4)	5,788 (12.6)	20,750 (45.2)	6,940 (15.1)	6,390 (13.9)	634 (1.4)	574 (1.2)	972 (2.1)	91 (0.2)	124 (0.3)	45,945 (100.0)	470	46,415	209.13	34.49
5.0～ (%)	1 (0.0)	26 (0.1)	149 (0.4)	1,576 (4.4)	820 (2.3)	4,276 (11.9)	15,904 (44.3)	5,537 (15.4)	5,434 (15.1)	584 (1.6)	513 (1.4)	920 (2.6)	88 (0.2)	93 (0.3)	35,921 (100.0)	368	36,289	211.18	34.98
6.0～ (%)		20 (0.1)	88 (0.5)	885 (4.8)	436 (2.4)	2,091 (11.5)	8,072 (44.2)	2,789 (15.3)	2,706 (14.8)	284 (1.6)	279 (1.5)	473 (2.6)	65 (0.4)	66 (0.4)	18,254 (100.0)	173	18,427	211.16	36.23
7.0～ (%)		1 (0.0)	34 (0.5)	370 (5.3)	163 (2.3)	837 (11.9)	3,086 (43.8)	1,060 (15.1)	1,023 (14.5)	94 (1.3)	103 (1.5)	202 (2.9)	28 (0.4)	38 (0.5)	7,039 (100.0)	69	7,108	211.40	37.82
8.0～ (%)		2 (0.1)	15 (0.7)	116 (5.3)	54 (2.5)	276 (12.7)	969 (44.6)	311 (14.3)	295 (13.6)	35 (1.6)	32 (1.5)	51 (2.3)	6 (0.3)	12 (0.6)	2,174 (100.0)	21	2,195	209.75	37.68
9.0～ (%)		2 (0.2)	7 (0.6)	59 (4.9)	41 (3.4)	148 (12.4)	532 (44.6)	166 (13.9)	149 (12.5)	18 (1.5)	13 (1.1)	42 (3.5)	6 (0.5)	11 (0.9)	1,194 (100.0)	11	1,205	211.17	42.28
合計 (%)	14 (0.0)	243 (0.1)	993 (0.6)	9,921 (5.8)	4,312 (2.5)	21,686 (12.6)	76,958 (44.9)	25,211 (14.7)	23,150 (13.5)	2,305 (1.3)	2,101 (1.2)	3,735 (2.2)	383 (0.2)	490 (0.3)	171,502 (100.0)	1,947	173,449	208.37	35.22
記載なし (%)		4 (0.1)	8 (0.2)	227 (6.8)	59 (1.8)	450 (13.6)	1,660 (50.0)	400 (12.1)	335 (10.1)	13 (0.4)	14 (0.4)	46 (1.4)	2 (0.1)	100 (3.0)	3,318 (100.0)	1,442	4,760	211.87	57.96
総計 (%)	14 (0.0)	247 (0.1)	1,001 (0.6)	10,148 (5.8)	4,371 (2.5)	22,136 (12.7)	78,618 (45.0)	25,611 (14.6)	23,485 (13.4)	2,318 (1.3)	2,115 (1.2)	3,781 (2.2)	385 (0.2)	590 (0.3)	174,820 (100.0)	3,389	178,209	208.43	35.79
平均	2.91	3.49	4.03	4.14	4.41	4.43	4.52	4.62	4.70	4.78	4.83	4.82	5.08	4.93	4.54	4.27	4.53		
標準偏差	2.09	1.98	1.94	1.83	1.74	1.67	1.64	1.59	1.56	1.54	1.54	1.61	1.78	1.84	1.65	1.74	1.65		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査