

表 2038 HDF希釈方法 nPCR(g/kg/day)別（オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	1 (9.1)	10 (90.9)			11 (100.0)		3	14
0.4～ (%)	20 (12.5)	140 (87.5)			160 (100.0)		40	200
0.6～ (%)	150 (12.8)	1,024 (87.1)	1 (0.1)		1,175 (100.0)		234	1,409
0.8～ (%)	246 (13.2)	1,619 (86.6)	1 (0.1)	3 (0.2)	1,869 (100.0)		318	2,187
1.0～ (%)	96 (11.4)	745 (88.6)			841 (100.0)		166	1,007
1.2～ (%)	18 (11.6)	135 (87.1)	2 (1.3)		155 (100.0)		21	176
1.4～ (%)	1 (5.3)	18 (94.7)			19 (100.0)		2	21
1.6～ (%)		3 (100.0)			3 (100.0)			3
1.8～ (%)								
2.0～ (%)		2 (100.0)			2 (100.0)		1	3
合計 (%)	532 (12.6)	3,696 (87.3)	4 (0.1)	3 (0.1)	4,235 (100.0)		785	5,020
記載なし (%)	33 (15.1)	183 (83.9)	1 (0.5)	1 (0.5)	218 (100.0)		82	300
総計 (%)	565 (12.7)	3,879 (87.1)	5 (0.1)	4 (0.1)	4,453 (100.0)		867	5,320
平均	0.87	0.88	1.01	0.89	0.88		0.87	0.88
標準偏差	0.17	0.18	0.26	0.04	0.18		0.19	0.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査