

表 2075 HDF希釈方法 糖尿病の既往別（オンラインHDF 透析回数週3回）

| 糖尿病の既往      | 前希釈               | 後希釈              | 前・後希釈 | その他              | 合計                | 不明           | 記載なし             | 総計                |
|-------------|-------------------|------------------|-------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 既往なし<br>(%) | 14,464<br>(55.7)  | 670<br>(57.7)    |       | 510<br>(46.2)    | 15,644<br>(55.4)  |              | 725<br>(55.3)    | 16,369<br>(55.4)  |
| 既往あり<br>(%) | 11,497<br>(44.3)  | 492<br>(42.3)    |       | 595<br>(53.8)    | 12,584<br>(44.6)  | 1<br>(100.0) | 587<br>(44.7)    | 13,172<br>(44.6)  |
| 合計<br>(%)   | 25,961<br>(100.0) | 1,162<br>(100.0) |       | 1,105<br>(100.0) | 28,228<br>(100.0) | 1<br>(100.0) | 1,312<br>(100.0) | 29,541<br>(100.0) |
| 不明          | 32                | 3                |       |                  | 35                |              | 7                | 42                |
| 記載なし        | 2,790             | 161              |       | 175              | 3,126             |              | 591              | 3,717             |
| 総計          | 28,783            | 1,326            |       | 1,280            | 31,389            | 1            | 1,910            | 33,300            |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査