

表 2151 1セッションあたりの置換液量(L) PTH値(pg/mL)別（オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		1 (10.0)	9 (90.0)				10 (100.0)		10	6.40	1.26
20～ (%)		1 (11.1)	4 (44.4)	2 (22.2)		2 (22.2)	9 (100.0)	1	10	10.67	7.81
35～ (%)			1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		2	10.00	2.83
50～ (%)		2 (22.2)	3 (33.3)	2 (22.2)		2 (22.2)	9 (100.0)		9	11.33	9.27
75～ (%)		2 (20.0)	3 (30.0)	2 (20.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	10 (100.0)		10	10.10	6.47
100～ (%)				1 (100.0)			1 (100.0)		1	10.00	
125～ (%)		1 (50.0)		1 (50.0)			2 (100.0)		2	8.00	5.66
150～ (%)											
151～ (%)				1 (100.0)			1 (100.0)	1	2	10.00	
180～ (%)		1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)		1 (25.0)	4 (100.0)		4	11.00	9.02
210～ (%)								1	1		
240～ (%)		1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)			3 (100.0)		3	7.33	4.16
300～ (%)											
350～ (%)											
400～ (%)											
500～ (%)											
合計 (%)		9 (17.6)	22 (43.1)	12 (23.5)	2 (3.9)	6 (11.8)	51 (100.0)	3	54	9.51	6.41
記載なし (%)						2 (100.0)	2 (100.0)		2	24.00	
総計 (%)		9 (17.0)	22 (41.5)	12 (22.6)	2 (3.8)	8 (15.1)	53 (100.0)	3	56	10.06	6.88
平均		103.67	51.59	100.67	95.50	76.00	76.92	136.67	80.24		
標準偏差		80.01	59.99	67.39	4.95	56.37	66.43	102.68	68.94		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査