

表 2152 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈）

透析前ヘモグロビン濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)		1 (100.0)					1 (100.0)		1	1.00	
5～ (%)			1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		2	8.00	2.83
6～ (%)		2 (33.3)	4 (66.7)				6 (100.0)		6	4.50	2.88
7～ (%)		3 (27.3)	6 (54.5)	2 (18.2)			11 (100.0)		11	6.73	3.35
8～ (%)		2 (9.1)	8 (36.4)	10 (45.5)		2 (9.1)	22 (100.0)	1	23	10.00	6.26
9～ (%)		21 (19.6)	36 (33.6)	30 (28.0)	1 (0.9)	19 (17.8)	107 (100.0)	3	110	10.23	7.56
10～ (%)		33 (16.6)	70 (35.2)	66 (33.2)	4 (2.0)	26 (13.1)	199 (100.0)	6	205	9.99	6.60
11～ (%)		16 (9.6)	59 (35.5)	61 (36.7)	7 (4.2)	23 (13.9)	166 (100.0)	3	169	10.58	6.25
12～ (%)		5 (8.6)	19 (32.8)	26 (44.8)	1 (1.7)	7 (12.1)	58 (100.0)	4	62	10.67	6.53
13～ (%)		2 (11.1)	8 (44.4)	6 (33.3)		2 (11.1)	18 (100.0)		18	10.33	6.59
14～ (%)		3 (15.0)	7 (35.0)	6 (30.0)	1 (5.0)	3 (15.0)	20 (100.0)		20	10.60	7.08
合計 (%)		88 (14.4)	218 (35.7)	208 (34.1)	14 (2.3)	82 (13.4)	610 (100.0)	17	627	10.16	6.62
記載なし (%)		1 (20.0)	2 (40.0)		1 (20.0)	1 (20.0)	5 (100.0)	2	7	12.40	9.40
総計 (%)		89 (14.5)	220 (35.8)	208 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.5)	615 (100.0)	19	634	10.18	6.64
平均		10.36	10.77	10.91	11.37	10.88	10.79	10.65	10.78		
標準偏差		1.63	1.65	1.41	1.26	1.26	1.52	1.21	1.51		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査