

表 2154 1セッションあたりの置換液量(L) HDL-C濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

HDL-C濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)											
20～ (%)		6 (18.2)	11 (33.3)	13 (39.4)	1 (3.0)	2 (6.1)	33 (100.0)		33	8.45	5.30
30～ (%)		25 (19.4)	54 (41.9)	35 (27.1)	3 (2.3)	12 (9.3)	129 (100.0)	1	130	9.04	6.49
40～ (%)		25 (18.0)	46 (33.1)	52 (37.4)	2 (1.4)	14 (10.1)	139 (100.0)	2	141	9.27	5.70
50～ (%)		11 (13.4)	29 (35.4)	31 (37.8)	2 (2.4)	9 (11.0)	82 (100.0)	2	84	9.91	6.06
60～ (%)		6 (10.2)	21 (35.6)	26 (44.1)	1 (1.7)	5 (8.5)	59 (100.0)	2	61	9.92	5.84
70～ (%)		5 (20.8)	9 (37.5)	8 (33.3)		2 (8.3)	24 (100.0)		24	8.83	5.35
80～ (%)			4 (57.1)	2 (28.6)	1 (14.3)		7 (100.0)		7	9.00	4.04
90～ (%)			4 (80.0)	1 (20.0)			5 (100.0)		5	7.60	2.61
100～ (%)		1 (20.0)		4 (80.0)			5 (100.0)		5	9.20	3.03
合計 (%)		79 (16.4)	178 (36.9)	172 (35.6)	10 (2.1)	44 (9.1)	483 (100.0)	7	490	9.30	5.88
記載なし (%)		10 (7.6)	42 (31.8)	36 (27.3)	5 (3.8)	39 (29.5)	132 (100.0)	12	144	13.39	8.14
総計 (%)		89 (14.5)	220 (35.8)	208 (33.8)	15 (2.4)	83 (13.5)	615 (100.0)	19	634	10.18	6.64
平均		45.10	47.72	49.37	46.70	46.70	47.77	50.29	47.80		
標準偏差		13.67	15.56	16.82	18.31	12.17	15.53	11.32	15.47		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査