

表 2164 1セッションあたりの置換液量(L) 原疾患別 (オンラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

原疾患	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	120 (1.2)	188 (1.8)	236 (2.3)	158 (1.5)	1,318 (12.9)	1,777 (17.4)	3,924 (38.4)	970 (9.5)	1,108 (10.8)	247 (2.4)	125 (1.2)	54 (0.5)	10,225 (100.0)	390	10,615	41.42	15.66	
慢性腎盂腎炎 (%)	2 (0.7)	8 (2.8)	9 (3.1)	6 (2.1)	44 (15.3)	40 (13.9)	122 (42.4)	19 (6.6)	30 (10.4)	2 (0.7)	5 (1.7)	1 (0.3)	288 (100.0)	12	300	39.80	15.54	
急速進行性糸球 体腎炎 (%)	1 (0.5)	7 (3.4)	5 (2.4)	4 (1.9)	24 (11.7)	46 (22.3)	80 (38.8)	8 (3.9)	24 (11.7)	4 (1.9)	2 (1.0)	1 (0.5)	206 (100.0)	5	211	40.12	15.69	
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)	2 (0.9)	1 (0.4)	8 (3.4)	3 (1.3)	32 (13.7)	46 (19.7)	84 (35.9)	16 (6.8)	29 (12.4)	8 (3.4)	4 (1.7)	1 (0.4)	234 (100.0)	15	249	41.91	16.15	
その他の分類不 能の腎炎 (%)	5 (3.6)	3 (2.1)	3 (2.1)	3 (2.1)	10 (7.1)	23 (16.4)	59 (42.1)	14 (10.0)	10 (7.1)	7 (5.0)	2 (1.4)	1 (0.7)	140 (100.0)	1	141	41.63	17.28	
多発性嚢胞腎 (%)	7 (0.7)	27 (2.5)	22 (2.1)	19 (1.8)	158 (14.8)	187 (17.5)	453 (42.5)	72 (6.7)	90 (8.4)	14 (1.3)	10 (0.9)	8 (0.7)	1,067 (100.0)	25	1,092	40.09	15.12	
腎硬化症 (%)	37 (1.8)	64 (3.1)	87 (4.2)	77 (3.7)	426 (20.4)	403 (19.3)	714 (34.2)	89 (4.3)	126 (6.0)	37 (1.8)	21 (1.0)	4 (0.2)	2,085 (100.0)	55	2,140	36.23	15.94	
悪性高血圧 (%)	1 (0.4)	3 (1.3)	3 (1.3)	5 (2.2)	32 (14.3)	47 (21.0)	85 (37.9)	19 (8.5)	19 (8.5)	7 (3.1)	3 (1.3)		224 (100.0)	8	232	40.50	14.65	
糖尿病性腎症 (%)	172 (1.8)	199 (2.1)	251 (2.7)	229 (2.4)	1,607 (17.2)	1,896 (20.2)	3,373 (36.0)	557 (5.9)	787 (8.4)	159 (1.7)	79 (0.8)	57 (0.6)	9,366 (100.0)	285	9,651	38.48	15.86	
SLE腎炎 (%)	3 (1.2)	5 (2.0)	5 (2.0)	2 (0.8)	38 (14.9)	46 (18.0)	97 (38.0)	33 (12.9)	21 (8.2)	3 (1.2)	1 (0.4)	1 (0.4)	255 (100.0)	8	263	40.44	14.55	
アミロイド腎 (%)	1 (2.4)	2 (4.9)		1 (2.4)	10 (24.4)	10 (26.8)	11 (7.3)	3 (7.3)					41 (100.0)	1	42	35.00	14.95	
痛風腎 (%)	2 (1.9)	1 (1.0)	2 (1.9)	1 (1.0)	13 (12.4)	16 (15.2)	42 (40.0)	12 (11.4)	12 (11.4)	4 (3.8)			105 (100.0)	1	106	42.01	14.84	
先天性代謝異常 による腎不全 (%)			2 (6.3)		3 (9.4)	4 (12.5)	18 (56.3)	1 (3.1)	3 (9.4)	1 (3.1)			32 (100.0)		32	42.00	13.70	
腎・尿路結核 (%)	1 (7.7)	2 (15.4)		2 (15.4)	1 (7.7)	5 (7.7)		1 (7.7)					13 (100.0)	1	14	30.00	18.98	
腎・尿路結石 (%)			1 (2.1)	2 (4.3)	8 (17.0)	16 (34.0)	8 (17.0)	3 (6.4)	4 (8.5)	3 (6.4)	1 (2.1)	1 (2.1)	47 (100.0)	2	49	40.68	18.53	
腎・尿路腫瘍 (%)		4 (7.8)	1 (2.0)		8 (15.7)	11 (21.6)	14 (27.5)	5 (9.8)	7 (13.7)			1 (2.0)	51 (100.0)	1	52	38.94	17.03	
閉塞性尿路障害 (%)	3 (5.7)	1 (1.9)			9 (17.0)	9 (17.0)	22 (41.5)	2 (3.8)	5 (9.4)	1 (1.9)	1 (1.9)		53 (100.0)	4	57	38.11	15.80	
骨髄腫 (%)					2 (18.2)	5 (45.5)	4 (36.4)						11 (100.0)		11	35.36	8.77	
腎形成不全 (%)		1 (1.4)	2 (2.8)		9 (12.7)	10 (14.1)	33 (46.5)	5 (7.0)	9 (12.7)	1 (1.4)	1 (1.4)		71 (100.0)	2	73	42.87	14.21	
不明 (%)	39 (1.6)	56 (2.2)	51 (2.0)	69 (2.8)	383 (15.4)	493 (19.8)	882 (35.4)	191 (7.7)	255 (10.2)	32 (1.3)	30 (1.2)	11 (0.4)	2,492 (100.0)	65	2,557	39.53	15.88	
再導入 (%)	6 (2.1)	7 (2.5)	3 (1.1)	4 (1.4)	23 (8.1)	52 (18.2)	100 (35.1)	33 (11.6)	42 (14.7)	9 (3.2)	6 (2.1)		285 (100.0)	8	293	43.61	16.18	
その他 (%)	11 (1.9)	14 (2.4)	22 (3.7)	12 (2.0)	102 (17.2)	104 (17.5)	214 (36.1)	45 (7.6)	49 (8.3)	9 (1.5)	6 (1.0)	5 (0.8)	593 (100.0)	10	603	38.55	16.74	
合計 (%)	413 (1.5)	593 (2.1)	713 (2.6)	597 (2.1)	4,260 (15.3)	5,242 (18.8)	10,344 (37.1)	2,097 (7.5)	2,634 (9.4)	548 (2.0)	297 (1.1)	146 (0.5)	27,884 (100.0)	899	28,783	39.73	15.86	
記載なし (%)																		
総計 (%)	413 (1.5)	593 (2.1)	713 (2.6)	597 (2.1)	4,260 (15.3)	5,242 (18.8)	10,344 (37.1)	2,097 (7.5)	2,634 (9.4)	548 (2.0)	297 (1.1)	146 (0.5)	27,884 (100.0)	899	28,783	39.73	15.86	

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査