

表 2315 身長(cm) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前補正 カルシウム濃度	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)	2 (0.2)	4 (0.4)	11 (1.0)	32 (3.0)	96 (9.0)	145 (13.6)	158 (14.8)	215 (20.1)	189 (17.7)	147 (13.8)	46 (4.3)	18 (1.7)	4 (0.4)		1,067 (100.0)	75	1,142	160.63	9.94
7.0～ (%)		3 (0.2)	15 (1.0)	46 (3.1)	111 (7.4)	165 (11.0)	217 (14.5)	300 (20.0)	310 (20.7)	227 (15.2)	83 (5.5)	18 (1.2)	2 (0.1)		1,497 (100.0)	152	1,649	161.64	9.40
7.5～ (%)	7 (0.1)	19 (0.3)	46 (0.8)	174 (3.0)	451 (7.7)	768 (13.1)	910 (15.5)	1,188 (20.2)	1,094 (18.6)	803 (13.7)	316 (5.4)	81 (1.4)	14 (0.2)		5,871 (100.0)	528	6,399	161.12	9.49
8.0～ (%)	20 (0.1)	45 (0.2)	191 (1.0)	610 (3.2)	1,388 (7.4)	2,287 (12.1)	2,960 (15.7)	3,961 (21.0)	3,746 (19.9)	2,488 (13.2)	859 (4.6)	249 (1.3)	33 (0.2)	9 (0.0)	18,846 (100.0)	1,593	20,439	161.00	9.53
8.4～ (%)	5 (0.1)	16 (0.3)	53 (1.0)	192 (3.5)	420 (7.7)	664 (12.2)	869 (15.9)	1,127 (20.6)	1,077 (19.7)	713 (13.1)	235 (4.3)	79 (1.4)	12 (0.2)		5,462 (100.0)	410	5,872	160.97	9.47
8.5～ (%)	72 (0.1)	157 (0.3)	647 (1.0)	2,284 (3.6)	5,060 (8.1)	8,225 (13.1)	10,265 (16.4)	13,103 (20.9)	11,786 (18.8)	7,462 (11.9)	2,761 (4.4)	712 (1.1)	91 (0.1)	22 (0.0)	62,647 (100.0)	4,672	67,319	160.47	9.51
9.0～ (%)	82 (0.1)	199 (0.3)	823 (1.1)	2,958 (3.9)	6,877 (9.0)	11,142 (14.5)	12,721 (16.6)	15,119 (19.7)	13,664 (17.8)	8,842 (11.5)	3,221 (4.2)	833 (1.1)	138 (0.2)	21 (0.0)	76,640 (100.0)	5,364	82,004	159.99	9.62
9.5～ (%)	70 (0.1)	142 (0.3)	547 (1.1)	2,084 (4.1)	4,712 (9.3)	7,650 (15.1)	8,621 (17.0)	9,913 (19.6)	8,508 (16.8)	5,596 (11.1)	2,072 (4.1)	569 (1.1)	91 (0.2)	14 (0.0)	50,589 (100.0)	3,380	53,969	159.67	9.72
10.0～ (%)	9 (0.1)	18 (0.3)	73 (1.2)	252 (4.1)	556 (9.0)	946 (15.4)	1,071 (17.4)	1,169 (19.0)	1,055 (17.1)	700 (11.4)	215 (3.5)	74 (1.2)	16 (0.3)	3 (0.0)	6,157 (100.0)	441	6,598	159.62	9.74
10.1～ (%)	25 (0.2)	41 (0.3)	180 (1.1)	665 (4.2)	1,669 (10.6)	2,513 (15.9)	2,724 (17.3)	2,923 (18.5)	2,658 (16.8)	1,612 (10.2)	606 (3.8)	144 (0.9)	22 (0.1)	2 (0.0)	15,784 (100.0)	1,193	16,977	159.17	9.71
10.5～ (%)	29 (0.4)	13 (0.2)	83 (1.1)	351 (4.6)	783 (10.2)	1,248 (16.3)	1,328 (17.3)	1,486 (19.4)	1,238 (16.1)	776 (10.1)	257 (3.3)	63 (0.8)	17 (0.2)	2 (0.0)	7,674 (100.0)	596	8,270	158.88	10.03
11.0～ (%)	12 (0.5)	5 (0.2)	37 (1.4)	138 (5.4)	319 (12.4)	447 (17.4)	459 (17.9)	482 (18.8)	383 (14.9)	196 (7.6)	67 (2.6)	16 (0.6)	3 (0.1)		2,564 (100.0)	217	2,781	157.56	10.07
11.5～ (%)	2 (0.2)	3 (0.3)	9 (1.0)	43 (4.9)	109 (12.5)	158 (18.1)	143 (16.3)	165 (18.9)	137 (15.7)	65 (7.4)	34 (3.9)	5 (0.6)	2 (0.2)		875 (100.0)	98	973	158.00	9.78
12.0～ (%)	5 (0.8)	5 (0.8)	12 (2.0)	41 (6.8)	74 (12.2)	103 (17.0)	99 (16.4)	116 (19.2)	81 (13.4)	48 (7.9)	16 (2.6)	5 (0.8)			605 (100.0)	76	681	156.78	11.13
合計 (%)	340 (0.1)	670 (0.3)	2,727 (1.1)	9,870 (3.9)	22,625 (8.8)	36,461 (14.2)	42,545 (16.6)	51,267 (20.0)	45,926 (17.9)	29,675 (11.6)	10,788 (4.2)	2,866 (1.1)	445 (0.2)	73 (0.0)	256,278 (100.0)	18,795	275,073	160.04	9.65
記載なし (%)	14 (0.1)	26 (0.2)	110 (0.9)	427 (3.6)	1,048 (8.9)	1,774 (15.0)	1,927 (16.3)	2,383 (20.1)	2,062 (17.4)	1,399 (11.8)	531 (4.5)	113 (1.0)	20 (0.2)	4 (0.0)	11,838 (100.0)	23,197	35,035	160.05	9.69
総計 (%)	354 (0.1)	696 (0.3)	2,837 (1.1)	10,297 (3.8)	23,673 (8.8)	38,235 (14.3)	44,472 (16.6)	53,650 (20.0)	47,988 (17.9)	31,074 (11.6)	11,319 (4.2)	2,979 (1.1)	465 (0.2)	77 (0.0)	268,116 (100.0)	41,992	310,108	160.05	9.65
平均	9.42	9.20	9.23	9.26	9.26	9.25	9.21	9.17	9.15	9.13	9.13	9.12	9.19	9.11	9.19	9.17	9.19		
標準偏差	0.91	0.77	0.76	0.75	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.74	0.60	0.74	0.79	0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査