

表 2403 身長(cm) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		1 (0.7)	2 (1.3)	2 (1.3)	9 (5.9)	16 (10.5)	18 (11.8)	37 (24.2)	30 (19.6)	27 (17.6)	7 (4.6)	3 (2.0)	1 (0.7)		153 (100.0)	7	160	162.29	9.28
7.0～ (%)			2 (0.8)	6 (2.5)	18 (7.5)	29 (12.1)	29 (12.1)	50 (20.8)	54 (22.5)	34 (14.2)	18 (7.5)				240 (100.0)	19	259	161.89	9.05
7.5～ (%)	2 (0.2)	4 (0.5)	11 (1.3)	20 (2.3)	74 (8.4)	128 (14.6)	130 (14.8)	172 (19.6)	149 (17.0)	123 (14.0)	46 (5.2)	15 (1.7)	3 (0.3)		877 (100.0)	74	951	160.88	9.81
8.0～ (%)	2 (0.1)	3 (0.1)	14 (0.5)	81 (3.0)	195 (7.3)	332 (12.4)	430 (16.0)	525 (19.6)	538 (20.0)	392 (14.6)	134 (5.0)	34 (1.3)	4 (0.1)	1 (0.0)	2,685 (100.0)	183	2,868	161.41	9.52
8.4～ (%)			2 (0.3)	20 (2.6)	54 (7.1)	103 (13.5)	116 (15.2)	157 (20.6)	146 (19.2)	100 (13.1)	45 (5.9)	16 (2.1)	2 (0.3)		761 (100.0)	57	818	161.73	9.20
8.5～ (%)	11 (0.1)	13 (0.1)	65 (0.7)	274 (3.2)	697 (8.0)	1,093 (12.6)	1,383 (15.9)	1,822 (21.0)	1,595 (18.4)	1,156 (13.3)	442 (5.1)	125 (1.4)	13 (0.1)	3 (0.0)	8,692 (100.0)	609	9,301	161.05	9.57
9.0～ (%)	8 (0.1)	14 (0.1)	94 (0.9)	330 (3.1)	872 (8.1)	1,554 (14.4)	1,805 (16.7)	2,034 (18.8)	2,004 (18.5)	1,402 (13.0)	519 (4.8)	139 (1.3)	30 (0.3)	3 (0.0)	10,808 (100.0)	707	11,515	160.77	9.46
9.5～ (%)	8 (0.1)	25 (0.3)	59 (0.8)	240 (3.3)	599 (8.3)	1,087 (15.1)	1,243 (17.3)	1,361 (18.9)	1,242 (17.2)	866 (12.0)	357 (5.0)	100 (1.4)	17 (0.2)	1 (0.0)	7,205 (100.0)	407	7,612	160.38	9.60
10.0～ (%)		2 (0.2)	5 (0.6)	26 (3.1)	68 (8.0)	132 (15.6)	144 (17.0)	159 (18.8)	162 (19.1)	108 (12.8)	29 (3.4)	9 (1.1)	2 (0.2)	1 (0.1)	847 (100.0)	56	903	160.42	9.21
10.1～ (%)	3 (0.1)	6 (0.3)	14 (0.6)	79 (3.4)	202 (8.8)	377 (16.4)	381 (16.6)	433 (18.9)	381 (16.6)	296 (12.9)	99 (4.3)	24 (1.0)	1 (0.0)		2,296 (100.0)	156	2,452	160.04	9.42
10.5～ (%)	3 (0.3)	1 (0.1)	9 (0.8)	46 (4.2)	101 (9.1)	168 (15.2)	194 (17.6)	193 (17.5)	214 (19.4)	129 (11.7)	32 (2.9)	12 (1.1)	2 (0.2)		1,104 (100.0)	66	1,170	159.60	10.02
11.0～ (%)			1 (0.3)	13 (3.7)	40 (11.3)	69 (19.5)	60 (16.9)	64 (18.1)	50 (14.1)	33 (9.3)	13 (3.7)	10 (2.8)	1 (0.3)		354 (100.0)	29	383	159.38	9.58
11.5～ (%)			1 (0.8)	3 (2.4)	16 (13.0)	19 (15.4)	20 (16.3)	24 (19.5)	24 (19.5)	9 (7.3)	7 (5.7)				123 (100.0)	9	132	159.37	9.17
12.0～ (%)			2 (2.9)	6 (8.8)	10 (14.7)	14 (20.6)	9 (13.2)	11 (16.2)	8 (11.8)	6 (8.8)	2 (2.9)				68 (100.0)	3	71	156.07	9.81
合計 (%)	37 (0.1)	69 (0.2)	281 (0.8)	1,146 (3.2)	2,955 (8.2)	5,121 (14.1)	5,962 (16.5)	7,042 (19.4)	6,597 (18.2)	4,681 (12.9)	1,750 (4.8)	487 (1.3)	76 (0.2)	9 (0.0)	36,213 (100.0)	2,382	38,595	160.73	9.54
記載なし (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	8 (1.2)	17 (2.5)	40 (5.9)	91 (13.3)	117 (17.2)	135 (19.8)	125 (18.3)	104 (15.2)	36 (5.3)	6 (0.9)	1 (0.1)		682 (100.0)	669	1,351	161.33	9.29
総計 (%)	38 (0.1)	70 (0.2)	289 (0.8)	1,163 (3.2)	2,995 (8.1)	5,212 (14.1)	6,079 (16.5)	7,177 (19.5)	6,722 (18.2)	4,785 (13.0)	1,786 (4.8)	493 (1.3)	77 (0.2)	9 (0.0)	36,895 (100.0)	3,051	39,946	160.74	9.54
平均	9.24	9.26	9.20	9.25	9.24	9.25	9.21	9.16	9.16	9.14	9.14	9.15	9.19	9.00	9.19	9.16	9.19		
標準偏差	0.78	0.75	0.77	0.75	0.76	0.76	0.73	0.75	0.74	0.74	0.72	0.73	0.69	0.56	0.75	0.74	0.75		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査