

表 2429 身長(cm) 補正カルシウム濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

補正 カルシウム濃度	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)				3 (10.7)	1 (3.6)	4 (14.3)	4 (14.3)	6 (21.4)	3 (10.7)	3 (10.7)	4 (14.3)				28 (100.0)	1	29	160.79	10.85
7.0～ (%)				2 (6.3)	1 (3.1)	3 (9.4)	1 (3.1)	6 (18.8)	8 (25.0)	9 (28.1)	2 (6.3)				32 (100.0)	4	36	164.13	9.40
7.5～ (%)				2 (1.7)	14 (11.6)	14 (11.6)	21 (17.4)	22 (18.2)	20 (16.5)	18 (14.9)	8 (6.6)	2 (1.7)			121 (100.0)	6	127	161.26	9.38
8.0～ (%)	1 (0.4)		1 (0.4)	4 (1.5)	9 (3.4)	21 (8.0)	42 (16.0)	51 (19.4)	57 (21.7)	48 (18.3)	19 (7.2)	9 (3.4)	1 (0.4)		263 (100.0)	23	286	163.95	9.29
8.4～ (%)			2 (2.5)	1 (1.3)	3 (3.8)	8 (10.0)	10 (12.5)	17 (21.3)	18 (22.5)	12 (15.0)	7 (8.8)	1 (1.3)	1 (1.3)		80 (100.0)	6	86	163.49	9.58
8.5～ (%)	2 (0.2)		6 (0.7)	26 (3.0)	45 (5.2)	88 (10.2)	139 (16.2)	158 (18.4)	171 (19.9)	151 (17.6)	55 (6.4)	17 (2.0)	2 (0.2)		860 (100.0)	46	906	162.56	9.74
9.0～ (%)	6 (0.4)	5 (0.3)	19 (1.3)	51 (3.4)	94 (6.2)	180 (11.9)	222 (14.7)	323 (21.4)	283 (18.7)	232 (15.3)	73 (4.8)	20 (1.3)	2 (0.1)	2 (0.1)	1,512 (100.0)	90	1,602	161.22	10.40
9.5～ (%)	11 (0.7)	4 (0.3)	13 (0.8)	54 (3.5)	101 (6.5)	199 (12.8)	250 (16.1)	326 (21.0)	286 (18.4)	203 (13.1)	83 (5.3)	21 (1.4)	1 (0.1)	2 (0.1)	1,554 (100.0)	75	1,629	160.75	10.81
10.0～ (%)	4 (2.2)		1 (0.6)	10 (5.6)	14 (7.9)	32 (18.0)	27 (15.2)	35 (19.7)	31 (17.4)	15 (8.4)	6 (3.4)	2 (1.1)	1 (0.6)		178 (100.0)	13	191	158.03	12.78
10.1～ (%)	5 (1.0)		7 (1.3)	19 (3.6)	60 (11.4)	89 (16.9)	96 (18.3)	94 (17.9)	82 (15.6)	42 (8.0)	27 (5.1)	5 (1.0)			526 (100.0)	31	557	158.39	11.44
10.5～ (%)	13 (4.6)		3 (1.1)	13 (4.6)	29 (10.2)	51 (18.0)	48 (17.0)	46 (16.3)	39 (13.8)	25 (8.8)	14 (4.9)	1 (0.4)	1 (0.4)		283 (100.0)	13	296	155.75	17.28
11.0～ (%)	6 (5.6)	1 (0.9)	3 (2.8)	4 (3.7)	12 (11.2)	18 (16.8)	20 (18.7)	18 (16.8)	15 (14.0)	5 (4.7)	5 (4.7)				107 (100.0)	4	111	153.23	19.88
11.5～ (%)	1 (3.8)			2 (7.7)	1 (3.8)	3 (11.5)	5 (19.2)	8 (30.8)	3 (11.5)	3 (11.5)					26 (100.0)	3	29	156.31	14.57
12.0～ (%)	5 (20.0)			1 (4.0)	3 (12.0)	3 (12.0)	3 (12.0)	4 (16.0)	1 (4.0)	3 (12.0)	1 (4.0)				25 (100.0)	2	27	145.28	26.43
合計 (%)	54 (1.0)	10 (0.2)	56 (1.0)	192 (3.4)	387 (6.9)	713 (12.7)	888 (15.9)	1,114 (19.9)	1,017 (18.2)	769 (13.7)	304 (5.4)	78 (1.4)	9 (0.2)	4 (0.1)	5,595 (100.0)	317	5,912	160.58	11.57
記載なし (%)	8 (0.7)	1 (0.1)	6 (0.6)	35 (3.3)	83 (7.8)	154 (14.4)	161 (15.1)	216 (20.2)	195 (18.2)	135 (12.6)	62 (5.8)	9 (0.8)	4 (0.4)		1,069 (100.0)	1,960	3,029	160.43	11.71
総計 (%)	62 (0.9)	11 (0.2)	62 (0.9)	227 (3.4)	470 (7.1)	867 (13.0)	1,049 (15.7)	1,330 (20.0)	1,212 (18.2)	904 (13.6)	366 (5.5)	87 (1.3)	13 (0.2)	4 (0.1)	6,664 (100.0)	2,277	8,941	160.56	11.59
平均	10.32	9.60	9.61	9.50	9.57	9.53	9.44	9.41	9.33	9.24	9.29	9.22	9.20	9.47	9.41	9.37	9.41		
標準偏差	0.93	0.61	0.75	0.89	0.82	0.81	0.79	0.76	0.75	0.77	0.81	0.66	0.81	0.26	0.79	0.85	0.80		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査