

表 2501 透析後体重(kg) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	7 (0.0)	26 (0.2)	1,202 (8.2)	4,359 (29.6)	4,918 (33.4)	2,825 (19.2)	990 (6.7)	275 (1.9)	90 (0.6)	25 (0.2)	14 (0.1)	7 (0.0)	14,738 (100.0)	338	15,076	54.52	11.79
慢性腎盂腎炎 (%)		2 (0.5)	47 (11.4)	150 (36.4)	108 (26.2)	68 (16.5)	27 (6.6)	6 (1.5)	3 (0.7)	1 (0.2)			412 (100.0)	10	422	52.62	12.06
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1 (0.4)		28 (10.0)	109 (39.1)	83 (29.7)	35 (12.5)	18 (6.5)	4 (1.4)			1 (0.4)		279 (100.0)	5	284	52.15	11.93
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)		1 (0.3)	61 (17.2)	176 (49.7)	80 (22.6)	29 (8.2)	5 (1.4)	2 (0.6)					354 (100.0)	5	359	47.80	9.00
その他の分類不能の腎炎 (%)		2 (1.0)	14 (7.3)	54 (28.3)	62 (32.5)	42 (22.0)	13 (6.8)	1 (0.5)	2 (1.0)	1 (0.5)			191 (100.0)	4	195	54.90	11.93
多発性嚢胞腎 (%)			61 (4.3)	345 (24.2)	496 (34.8)	359 (25.2)	127 (8.9)	27 (1.9)	9 (0.6)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,427 (100.0)	37	1,464	57.01	11.30
腎硬化症 (%)		9 (0.3)	233 (8.2)	777 (27.4)	904 (31.9)	583 (20.5)	216 (7.6)	74 (2.6)	19 (0.7)	12 (0.4)	5 (0.2)	5 (0.2)	2,837 (100.0)	49	2,886	55.48	12.93
悪性高血圧 (%)		1 (0.3)	16 (5.2)	51 (16.7)	89 (29.2)	79 (25.9)	39 (12.8)	22 (7.2)	4 (1.3)	2 (0.7)	1 (0.3)	1 (0.3)	305 (100.0)	7	312	60.89	14.51
糖尿病性腎症 (%)	2 (0.0)	10 (0.1)	485 (3.8)	2,295 (17.9)	4,017 (31.3)	3,325 (25.9)	1,589 (12.4)	705 (5.5)	277 (2.2)	85 (0.7)	35 (0.3)	20 (0.2)	12,845 (100.0)	328	13,173	60.55	13.82
SLE腎炎 (%)			64 (17.9)	159 (44.5)	94 (26.3)	23 (6.4)	10 (2.8)	4 (1.1)	2 (0.6)	1 (0.3)			357 (100.0)	6	363	48.84	10.82
アミロイド腎 (%)			7 (11.9)	28 (47.5)	19 (32.2)	5 (8.5)							59 (100.0)		59	48.81	8.48
痛風腎 (%)		1 (0.7)	7 (4.7)	27 (18.2)	54 (36.5)	34 (23.0)	19 (12.8)	5 (3.4)	1 (0.7)				148 (100.0)	6	154	58.33	11.78
先天性代謝異常による腎不全 (%)			9 (21.4)	10 (23.8)	14 (33.3)	5 (11.9)	1 (2.4)	3 (7.1)					42 (100.0)	2	44	52.16	13.72
腎・尿路結核 (%)			5 (22.7)	7 (31.8)	6 (27.3)	2 (9.1)	1 (4.5)	1 (4.5)					22 (100.0)		22	50.45	12.32
腎・尿路結石 (%)		1 (1.5)	7 (10.3)	20 (29.4)	16 (23.5)	19 (27.9)	3 (4.4)	1 (1.5)		1 (1.5)			68 (100.0)	1	69	54.41	13.05
腎・尿路腫瘍 (%)			6 (7.1)	21 (24.7)	29 (34.1)	21 (24.7)	6 (7.1)	1 (1.2)	1 (1.2)				85 (100.0)		85	55.90	11.33
閉塞性尿路障害 (%)			10 (14.1)	16 (22.5)	25 (35.2)	11 (15.5)	7 (9.9)	2 (2.8)					71 (100.0)	3	74	54.49	12.29
骨髄腫 (%)			1 (5.3)	9 (47.4)	1 (5.3)	7 (36.8)	1 (5.3)						19 (100.0)		19	53.40	10.25
腎形成不全 (%)		4 (4.0)	13 (13.1)	25 (25.3)	27 (27.3)	23 (23.2)	2 (2.0)	3 (3.0)	1 (1.0)	1 (1.0)			99 (100.0)	2	101	53.38	14.38
不明 (%)	2 (0.1)	15 (0.4)	310 (9.2)	981 (29.0)	1,056 (31.2)	608 (18.0)	259 (7.7)	97 (2.9)	37 (1.1)	11 (0.3)	4 (0.1)	2 (0.1)	3,382 (100.0)	98	3,480	54.99	12.99
再導入 (%)			21 (5.2)	123 (30.4)	147 (36.3)	76 (18.8)	26 (6.4)	8 (2.0)	4 (1.0)				405 (100.0)	11	416	55.02	11.11
その他 (%)		4 (0.5)	75 (8.6)	263 (30.0)	245 (28.0)	186 (21.2)	64 (7.3)	32 (3.7)	5 (0.6)	1 (0.1)		1 (0.1)	876 (100.0)	13	889	55.09	12.75
合計 (%)	12 (0.0)	76 (0.2)	2,682 (6.9)	10,005 (25.6)	12,490 (32.0)	8,365 (21.4)	3,423 (8.8)	1,273 (3.3)	455 (1.2)	142 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	39,021 (100.0)	925	39,946	56.63	13.03
記載なし (%)																	
総計 (%)	12 (0.0)	76 (0.2)	2,682 (6.9)	10,005 (25.6)	12,490 (32.0)	8,365 (21.4)	3,423 (8.8)	1,273 (3.3)	455 (1.2)	142 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	39,021 (100.0)	925	39,946	56.63	13.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査