

表 2503 透析後体重(kg) 糖尿病の既往別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

糖尿病の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	6	48	1,664	5,837	6,294	3,754	1,333	399	117	33	17	13	19,515	170	19,685	54.49	12.00
(%)	(66.7)	(76.2)	(72.6)	(66.7)	(56.6)	(49.5)	(42.3)	(33.2)	(27.3)	(25.4)	(29.3)	(37.1)	(56.0)	(32.7)	(55.7)		
既往あり	3	15	629	2,919	4,832	3,825	1,820	802	312	97	41	22	15,317	350	15,667	60.04	13.80
(%)	(33.3)	(23.8)	(27.4)	(33.3)	(43.4)	(50.5)	(57.7)	(66.8)	(72.7)	(74.6)	(70.7)	(62.9)	(44.0)	(67.3)	(44.3)		
合計	9	63	2,293	8,756	11,126	7,579	3,153	1,201	429	130	58	35	34,832	520	35,352	56.93	13.11
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明			10	16	10	3	2	1					42	8	50	48.63	11.08
記載なし	3	13	379	1,233	1,354	783	268	71	26	12	3	2	4,147	397	4,544	54.15	12.03
総計	12	76	2,682	10,005	12,490	8,365	3,423	1,273	455	142	61	37	39,021	925	39,946	56.63	13.03

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査