

表 2504 透析後体重(kg) 心筋梗塞の既往別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

心筋梗塞の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	8	59	2,000	7,457	9,188	6,228	2,593	962	337	105	50	29	29,016	144	29,160	56.69	13.11
(%)	(100.0)	(93.7)	(91.1)	(89.7)	(88.6)	(89.2)	(89.7)	(89.6)	(89.6)	(92.9)	(94.3)	(90.6)	(89.4)	(80.4)	(89.3)		
既往あり		4	195	857	1,181	756	297	112	39	8	3	3	3,455	35	3,490	56.87	12.40
(%)		(6.3)	(8.9)	(10.3)	(11.4)	(10.8)	(10.3)	(10.4)	(10.4)	(7.1)	(5.7)	(9.4)	(10.6)	(19.6)	(10.7)		
合計	8	63	2,195	8,314	10,369	6,984	2,890	1,074	376	113	53	32	32,471	179	32,650	56.71	13.04
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明			11	16	20	12	1	2					62	10	72	52.06	11.17
記載なし	4	13	476	1,675	2,101	1,369	532	197	79	29	8	5	6,488	736	7,224	56.27	13.00
総計	12	76	2,682	10,005	12,490	8,365	3,423	1,273	455	142	61	37	39,021	925	39,946	56.63	13.03

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査