

表 2538 透析後体重(kg) nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)				4 (20.0)	6 (30.0)	8 (40.0)		1 (5.0)	1 (5.0)				20 (100.0)		20	59.70	11.94
0.4～ (%)		1 (0.1)	12 (1.6)	146 (20.1)	260 (35.7)	168 (23.1)	90 (12.4)	28 (3.8)	17 (2.3)	6 (0.8)			728 (100.0)		728	59.94	12.79
0.6～ (%)		1 (0.0)	69 (1.1)	886 (14.6)	2,093 (34.4)	1,770 (29.1)	788 (13.0)	306 (5.0)	109 (1.8)	32 (0.5)	15 (0.2)	10 (0.2)	6,079 (100.0)		6,079	61.49	12.44
0.8～ (%)		2 (0.0)	105 (1.1)	1,309 (13.8)	3,417 (35.9)	2,816 (29.6)	1,176 (12.4)	435 (4.6)	163 (1.7)	49 (0.5)	19 (0.2)	14 (0.1)	9,505 (100.0)		9,505	61.39	12.13
1.0～ (%)		1 (0.0)	51 (1.4)	550 (15.2)	1,398 (38.7)	1,009 (27.9)	399 (11.0)	132 (3.7)	47 (1.3)	13 (0.4)	6 (0.2)	7 (0.2)	3,613 (100.0)		3,613	60.17	11.71
1.2～ (%)		1 (0.2)	6 (1.1)	103 (18.1)	229 (40.2)	149 (26.2)	55 (9.7)	18 (3.2)	5 (0.9)	2 (0.4)	1 (0.2)		569 (100.0)		569	58.91	11.18
1.4～ (%)			1 (2.1)	4 (8.3)	28 (58.3)	13 (27.1)	2 (4.2)						48 (100.0)		48	57.23	7.78
1.6～ (%)					1 (20.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)					5 (100.0)		5	67.04	12.75
1.8～ (%)																	
2.0～ (%)	1 (33.3)					1 (33.3)		1 (33.3)					3 (100.0)		3	53.97	32.10
合計 (%)	1 (0.0)	6 (0.0)	244 (1.2)	3,002 (14.6)	7,432 (36.1)	5,936 (28.9)	2,511 (12.2)	922 (4.5)	342 (1.7)	102 (0.5)	41 (0.2)	31 (0.2)	20,570 (100.0)		20,570	61.07	12.16
記載なし (%)	7 (1.0)		10 (1.4)	131 (18.2)	251 (34.9)	201 (28.0)	81 (11.3)	25 (3.5)	8 (1.1)	4 (0.6)	1 (0.1)		719 (100.0)	487	1,206	59.14	12.75
総計 (%)	8 (0.0)	6 (0.0)	254 (1.2)	3,133 (14.7)	7,683 (36.1)	6,137 (28.8)	2,592 (12.2)	947 (4.4)	350 (1.6)	106 (0.5)	42 (0.2)	31 (0.1)	21,289 (100.0)	487	21,776	61.01	12.19
平均	2.85	0.93	0.87	0.87	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.86	0.86	0.87		0.87		
標準偏差		0.31	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	0.13	0.12	0.16		0.16		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査