

表 2626 体重減少量(kg) PTH値(pg/mL)別(施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上) PTH測定法:intact-PTH

PTH値	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	45 (0.6)	593 (8.0)	2,180 (29.3)	2,948 (39.7)	1,332 (17.9)	253 (3.4)	64 (0.9)	5 (0.1)	1 (0.0)	7 (0.1)	7,428 (100.0)	49	7,477	2.26	1.04
20～ (%)	61 (0.6)	733 (6.9)	2,899 (27.2)	4,499 (42.2)	1,970 (18.5)	395 (3.7)	67 (0.6)	15 (0.1)	7 (0.1)	8 (0.1)	10,654 (100.0)	70	10,724	2.32	1.03
40～ (%)	54 (0.5)	715 (6.3)	3,016 (26.4)	4,801 (42.0)	2,267 (19.8)	461 (4.0)	88 (0.8)	13 (0.1)	1 (0.0)	7 (0.1)	11,423 (100.0)	79	11,502	2.36	1.00
60～ (%)	64 (0.5)	654 (5.4)	3,179 (26.3)	5,124 (42.4)	2,399 (19.8)	514 (4.2)	119 (1.0)	28 (0.2)	10 (0.1)	7 (0.1)	12,098 (100.0)	92	12,190	2.40	1.02
80～ (%)	61 (0.5)	662 (5.4)	3,023 (24.5)	5,340 (43.3)	2,577 (20.9)	566 (4.6)	84 (0.7)	16 (0.1)	7 (0.1)	9 (0.1)	12,345 (100.0)	91	12,436	2.42	0.99
100～ (%)	52 (0.4)	566 (4.7)	2,876 (23.9)	5,238 (43.5)	2,574 (21.4)	587 (4.9)	117 (1.0)	30 (0.2)	6 (0.0)	8 (0.1)	12,054 (100.0)	84	12,138	2.46	1.01
120～ (%)	37 (0.3)	483 (4.2)	2,695 (23.6)	4,950 (43.3)	2,527 (22.1)	591 (5.2)	114 (1.0)	23 (0.2)	7 (0.1)	12 (0.1)	11,439 (100.0)	61	11,500	2.50	1.03
140～ (%)	48 (0.5)	429 (4.1)	2,371 (22.7)	4,540 (43.4)	2,349 (22.5)	571 (5.5)	115 (1.1)	18 (0.2)	3 (0.0)	9 (0.1)	10,453 (100.0)	66	10,519	2.51	0.99
160～ (%)	32 (0.3)	384 (4.0)	2,131 (22.4)	4,101 (43.1)	2,195 (23.1)	545 (5.7)	102 (1.1)	11 (0.1)	2 (0.0)	6 (0.1)	9,509 (100.0)	52	9,561	2.52	0.99
180～ (%)	75 (0.4)	796 (3.8)	4,546 (21.5)	9,028 (42.6)	5,111 (24.1)	1,271 (6.0)	270 (1.3)	41 (0.2)	12 (0.1)	23 (0.1)	21,173 (100.0)	131	21,304	2.57	1.07
240～ (%)	6 (0.0)	59 (2.4)	117 (23.1)	59 (45.9)	10 (3.9)	4 (1.6)					255 (100.0)	4	259	2.53	0.89
241～ (%)	43 (0.4)	410 (3.4)	2,414 (20.2)	5,076 (42.4)	3,016 (25.2)	800 (6.7)	155 (1.3)	39 (0.3)	4 (0.0)	14 (0.1)	11,971 (100.0)	71	12,042	2.62	1.08
300～ (%)	24 (0.3)	218 (3.2)	1,361 (19.8)	2,890 (42.0)	1,707 (24.8)	533 (7.7)	119 (1.7)	23 (0.3)	5 (0.1)	9 (0.1)	6,889 (100.0)	48	6,937	2.66	1.07
360～ (%)	12 (0.3)	124 (3.2)	797 (20.4)	1,524 (39.0)	1,046 (26.7)	296 (7.6)	78 (2.0)	22 (0.6)	5 (0.1)	8 (0.2)	3,912 (100.0)	18	3,930	2.70	1.19
420～ (%)	11 (0.5)	87 (3.7)	435 (18.7)	950 (40.8)	584 (25.1)	200 (8.6)	51 (2.2)	11 (0.5)	1 (0.0)	1 (0.0)	2,331 (100.0)	16	2,347	2.69	1.08
480～ (%)	16 (2.8)	108 (18.9)	221 (38.7)	158 (27.7)	49 (8.6)	13 (2.3)	6 (1.1)				571 (100.0)	5	576	2.75	1.06
500～ (%)	4 (0.4)	38 (4.1)	160 (17.2)	374 (40.3)	229 (24.7)	96 (10.3)	23 (2.5)	2 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.1)	928 (100.0)	6	934	2.73	1.09
540～ (%)	1 (0.1)	32 (3.1)	216 (21.2)	380 (37.3)	256 (25.1)	98 (9.6)	23 (2.3)	9 (0.9)	3 (0.3)	2 (0.2)	1,020 (100.0)	6	1,026	2.75	1.19
600～ (%)	7 (0.4)	57 (3.4)	306 (18.1)	636 (37.6)	458 (27.1)	157 (9.3)	50 (3.0)	16 (0.9)	3 (0.2)		1,690 (100.0)	10	1,700	2.77	1.12
800～ (%)	9 (0.6)	51 (3.7)	300 (21.5)	497 (35.6)	331 (23.7)	144 (10.3)	38 (2.7)	21 (1.5)	1 (0.1)	3 (0.2)	1,395 (100.0)	10	1,405	2.76	1.42
合計 (%)	640 (0.4)	7,054 (4.7)	35,072 (23.5)	63,234 (42.3)	33,145 (22.2)	8,137 (5.4)	1,694 (1.1)	349 (0.2)	79 (0.1)	134 (0.1)	149,538 (100.0)	969	150,507	2.49	1.05
記載なし (%)	10 (0.4)	209 (7.9)	763 (29.0)	1,063 (40.4)	463 (17.6)	94 (3.6)	21 (0.8)	1 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.2)	2,631 (100.0)	467	3,098	2.29	1.10
総計 (%)	650 (0.4)	7,263 (4.8)	35,835 (23.5)	64,297 (42.3)	33,608 (22.1)	8,231 (5.4)	1,715 (1.1)	350 (0.2)	80 (0.1)	140 (0.1)	152,169 (100.0)	1,436	153,605	2.49	1.05
平均	154.41	141.54	156.77	167.24	182.77	209.66	230.93	293.86	210.68	196.06	170.34	166.31	170.31		
標準偏差	154.94	152.76	158.81	157.82	168.19	195.58	237.26	325.05	183.37	167.20	164.96	166.57	164.97		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査