

表 2729 体重減少率(%) single pool Kt/V(Kt/Vsp)別(血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	1 (10.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	2 (20.0)	2 (20.0)		1 (10.0)				10 (100.0)		10	3.03	1.88
0.4～ (%)			2 (33.3)	2 (33.3)	2 (33.3)						6 (100.0)		6	3.47	0.77
0.6～ (%)	2 (10.5)	4 (21.1)	4 (21.1)	4 (21.1)	2 (10.5)	3 (15.8)					19 (100.0)		19	3.04	1.61
0.8～ (%)	4 (4.7)	15 (17.6)	17 (20.0)	17 (20.0)	15 (17.6)	14 (16.5)	3 (3.5)				85 (100.0)		85	3.45	1.58
1.0～ (%)	29 (7.3)	27 (6.8)	57 (14.4)	100 (25.3)	90 (22.8)	55 (13.9)	23 (5.8)	6 (1.5)	3 (0.8)	5 (1.3)	395 (100.0)		395	3.82	1.80
1.2～ (%)	40 (2.9)	67 (4.9)	171 (12.6)	369 (27.2)	385 (28.3)	205 (15.1)	95 (7.0)	20 (1.5)	4 (0.3)	3 (0.2)	1,359 (100.0)		1,359	4.05	1.47
1.4～ (%)	55 (2.0)	111 (4.0)	275 (9.9)	623 (22.4)	787 (28.3)	559 (20.1)	253 (9.1)	83 (3.0)	22 (0.8)	10 (0.4)	2,778 (100.0)		2,778	4.40	1.52
1.6～ (%)	44 (1.3)	89 (2.6)	282 (8.2)	638 (18.6)	939 (27.4)	825 (24.1)	392 (11.5)	149 (4.4)	48 (1.4)	17 (0.5)	3,423 (100.0)		3,423	4.70	1.54
1.8～ (%)	27 (1.1)	52 (2.2)	131 (5.5)	442 (18.5)	606 (25.4)	581 (24.3)	346 (14.5)	142 (5.9)	45 (1.9)	16 (0.7)	2,388 (100.0)		2,388	4.91	1.56
2.0～ (%)	11 (0.6)	42 (2.2)	131 (6.9)	280 (14.8)	429 (22.6)	486 (25.6)	294 (15.5)	147 (7.7)	50 (2.6)	27 (1.4)	1,897 (100.0)	7	1,904	5.11	1.69
合計 (%)	213 (1.7)	410 (3.3)	1,071 (8.7)	2,477 (20.0)	3,257 (26.4)	2,728 (22.1)	1,407 (11.4)	547 (4.4)	172 (1.4)	78 (0.6)	12,360 (100.0)	7	12,367	4.62	1.61
記載なし (%)	11 (2.0)	26 (4.8)	70 (13.0)	110 (20.4)	130 (24.1)	109 (20.2)	53 (9.8)	21 (3.9)	5 (0.9)	5 (0.9)	540 (100.0)	288	828	4.43	1.75
総計 (%)	224 (1.7)	436 (3.4)	1,141 (8.8)	2,587 (20.1)	3,387 (26.3)	2,837 (22.0)	1,460 (11.3)	568 (4.4)	177 (1.4)	83 (0.6)	12,900 (100.0)	295	13,195	4.61	1.62
平均	1.50	1.56	1.61	1.65	1.69	1.75	1.78	1.85	1.86	1.85	1.70	2.52	1.70		
標準偏差	0.32	0.36	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.35	0.31	0.20	0.32		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査