

表 2762 Body Mass Index 糖尿病の有無別（透析患者全体）

| 糖尿病の有無 | 14未満    | 14～     | 16～     | 18～     | 20～     | 22～     | 24～     | 26～     | 28～     | 30～     | 合計      | 記載なし    | 総計      | 平均    | 標準偏差 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|------|
| 糖尿病なし  | 917     | 5,323   | 17,065  | 28,467  | 29,099  | 19,795  | 10,547  | 4,959   | 2,276   | 1,811   | 120,259 | 9,599   | 129,858 | 20.87 | 3.40 |
| (%)    | (65.5)  | (64.9)  | (63.0)  | (58.4)  | (53.3)  | (46.3)  | (40.5)  | (35.3)  | (31.2)  | (28.8)  | (50.9)  | (29.4)  | (48.3)  |       |      |
| 糖尿病あり  | 484     | 2,873   | 10,035  | 20,302  | 25,479  | 22,947  | 15,470  | 9,070   | 5,015   | 4,481   | 116,156 | 23,097  | 139,253 | 22.29 | 3.81 |
| (%)    | (34.5)  | (35.1)  | (37.0)  | (41.6)  | (46.7)  | (53.7)  | (59.5)  | (64.7)  | (68.8)  | (71.2)  | (49.1)  | (70.6)  | (51.7)  |       |      |
| 合計     | 1,401   | 8,196   | 27,100  | 48,769  | 54,578  | 42,742  | 26,017  | 14,029  | 7,291   | 6,292   | 236,415 | 32,696  | 269,111 | 21.57 | 3.68 |
| (%)    | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) |       |      |
| 不明     | 185     | 994     | 3,123   | 5,088   | 5,342   | 3,679   | 1,949   | 900     | 425     | 319     | 22,004  | 18,993  | 40,997  | 20.87 | 3.41 |
| 記載なし   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |      |
| 総計     | 1,586   | 9,190   | 30,223  | 53,857  | 59,920  | 46,421  | 27,966  | 14,929  | 7,716   | 6,611   | 258,419 | 51,689  | 310,108 | 21.51 | 3.66 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。  
\*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往が~~あり~~の患者。  
糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往が~~なし~~の患者。  
記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。  
不明とは、上記以外。