

表 2782 Body Mass Index 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回）

透析後体重	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	18 (100.0)										18 (100.0)	31	49	6.90	0.97
20～ (%)	25 (73.5)	7 (20.6)	1 (2.9)		1 (2.9)						34 (100.0)	6	40	12.34	2.98
30～ (%)	337 (13.8)	1,134 (46.5)	798 (32.7)	135 (5.5)	30 (1.2)	4 (0.2)		2 (0.1)	1 (0.0)		2,441 (100.0)	277	2,718	15.69	1.70
40～ (%)	42 (0.2)	1,877 (7.9)	9,401 (39.5)	9,659 (40.6)	2,498 (10.5)	264 (1.1)	29 (0.1)	9 (0.0)	8 (0.0)	7 (0.0)	23,794 (100.0)	2,117	25,911	18.15	1.61
50～ (%)	2 (0.0)	43 (0.1)	2,371 (4.8)	15,521 (31.4)	21,600 (43.7)	8,575 (17.3)	1,177 (2.4)	131 (0.3)	22 (0.0)	18 (0.0)	49,460 (100.0)	3,667	53,127	20.64	1.68
60～ (%)			14 (0.0)	951 (2.7)	8,305 (23.6)	15,273 (43.4)	8,486 (24.1)	1,851 (5.3)	253 (0.7)	53 (0.2)	35,186 (100.0)	2,330	37,516	23.17	1.79
70～ (%)				1 (0.0)	203 (1.4)	2,191 (15.4)	5,470 (38.4)	4,505 (31.6)	1,528 (10.7)	343 (2.4)	14,241 (100.0)	906	15,147	25.85	1.93
80～ (%)					2 (0.0)	38 (0.8)	476 (9.4)	1,519 (30.0)	1,785 (35.3)	1,236 (24.4)	5,056 (100.0)	362	5,418	28.60	2.07
90～ (%)							10 (0.6)	104 (6.1)	408 (23.9)	1,185 (69.4)	1,707 (100.0)	267	1,974	31.08	2.00
100～ (%)								3 (0.8)	32 (8.0)	364 (91.2)	399 (100.0)	295	694	32.58	1.69
110～ (%)									1 (1.6)	61 (98.4)	62 (100.0)	211	273	33.56	1.29
120～ (%)										3 (100.0)	3 (100.0)	175	178	34.69	0.21
合計 (%)	424 (0.3)	3,061 (2.3)	12,585 (9.5)	26,267 (19.8)	32,639 (24.7)	26,345 (19.9)	15,648 (11.8)	8,124 (6.1)	4,038 (3.0)	3,270 (2.5)	132,401 (100.0)	10,644	143,045	21.81	3.50
記載なし (%)												3,988	3,988		
総計 (%)	424 (0.3)	3,061 (2.3)	12,585 (9.5)	26,267 (19.8)	32,639 (24.7)	26,345 (19.9)	15,648 (11.8)	8,124 (6.1)	4,038 (3.0)	3,270 (2.5)	132,401 (100.0)	14,632	147,033	21.81	3.50
平均	34.66	41.15	46.24	51.46	56.81	62.36	68.27	74.39	80.75	89.74	59.39	61.99	59.58		
標準偏差	5.30	3.83	4.18	4.61	5.00	5.53	6.10	6.79	7.69	9.68	11.47	18.68	12.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査