

表 2894 透析前BUN(mg/dL) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)					1 (100.0)								1 (100.0)		1	57.00	
15歳～ (%)			1 (0.8)	10 (8.4)	29 (24.4)	28 (23.5)	30 (25.2)	7 (5.9)	9 (7.6)	5 (4.2)			119 (100.0)	5	124	67.64	15.44
30歳～ (%)		3 (0.1)	56 (2.7)	214 (10.1)	458 (21.7)	526 (24.9)	443 (21.0)	244 (11.6)	112 (5.3)	41 (1.9)	11 (0.5)	1 (0.0)	2,109 (100.0)	27	2,136	66.54	15.46
45歳～ (%)	7 (0.1)	51 (0.6)	280 (3.5)	917 (11.4)	1,872 (23.3)	2,167 (27.0)	1,557 (19.4)	778 (9.7)	292 (3.6)	71 (0.9)	25 (0.3)	4 (0.0)	8,021 (100.0)	161	8,182	64.04	14.81
60歳～ (%)	22 (0.1)	138 (0.8)	769 (4.6)	2,257 (13.6)	4,019 (24.2)	4,330 (26.0)	3,047 (18.3)	1,375 (8.3)	508 (3.1)	120 (0.7)	31 (0.2)	13 (0.1)	16,629 (100.0)	334	16,963	62.42	14.93
75歳～ (%)	9 (0.1)	111 (1.6)	526 (7.4)	1,339 (18.9)	1,854 (26.1)	1,695 (23.9)	973 (13.7)	412 (5.8)	126 (1.8)	41 (0.6)	6 (0.1)	2 (0.0)	7,094 (100.0)	189	7,283	58.56	14.86
90歳～ (%)	1 (0.4)	6 (2.2)	21 (7.6)	48 (17.4)	85 (30.8)	58 (21.0)	36 (13.0)	15 (5.4)	4 (1.4)	1 (0.4)	1 (0.4)		276 (100.0)	6	282	57.68	14.76
合計 (%)	39 (0.1)	309 (0.9)	1,653 (4.8)	4,785 (14.0)	8,318 (24.3)	8,804 (25.7)	6,086 (17.8)	2,831 (8.3)	1,051 (3.1)	279 (0.8)	74 (0.2)	20 (0.1)	34,249 (100.0)	722	34,971	62.23	15.08
不明 (%)																	
記載なし (%)																	
総計 (%)	39 (0.1)	309 (0.9)	1,653 (4.8)	4,785 (14.0)	8,318 (24.3)	8,804 (25.7)	6,086 (17.8)	2,831 (8.3)	1,051 (3.1)	279 (0.8)	74 (0.2)	20 (0.1)	34,249 (100.0)	722	34,971	62.23	15.08
平均	68.31	69.75	68.66	67.10	65.41	64.29	63.23	62.34	61.21	60.35	58.53	62.40	64.73	66.26	64.76		
標準偏差	10.17	11.41	11.60	11.95	12.14	11.91	11.99	12.11	12.53	13.86	13.48	10.82	12.16	12.43	12.17		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査