

表 2937 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	37 (0.0)	667 (0.6)	3,247 (3.0)	10,756 (9.8)	24,131 (22.0)	31,446 (28.7)	24,243 (22.1)	11,141 (10.2)	3,964 (3.6)	109,632 (100.0)	2,883	112,515	10.98	2.80
女性 (%)	39 (0.1)	989 (1.5)	4,548 (7.1)	13,250 (20.7)	21,984 (34.4)	16,588 (25.9)	5,511 (8.6)	895 (1.4)	136 (0.2)	63,940 (100.0)	1,754	65,694	9.12	2.34
合計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79
記載なし (%)														
総計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査