

表 2960 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)		70 (0.3)	377 (1.8)	1,529 (7.2)	4,218 (19.8)	6,177 (29.0)	5,300 (24.9)	2,620 (12.3)	1,017 (4.8)	21,308 (100.0)	468	21,776	11.43	2.69
女性 (%)	3 (0.0)	77 (0.6)	541 (4.2)	2,221 (17.2)	4,529 (35.1)	3,970 (30.8)	1,338 (10.4)	200 (1.5)	31 (0.2)	12,910 (100.0)	285	13,195	9.55	2.14
合計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
記載なし (%)														
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査