

表 2980 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前収縮 期血圧	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)					1 (100.0)					1 (100.0)		1	8.30	
60～ (%)		2 (1.8)	9 (8.3)	28 (25.7)	25 (22.9)	29 (26.6)	10 (9.2)	4 (3.7)	2 (1.8)	109 (100.0)	1	110	9.21	2.66
80～ (%)		3 (0.5)	33 (6.0)	119 (21.5)	176 (31.8)	130 (23.5)	58 (10.5)	25 (4.5)	9 (1.6)	553 (100.0)	8	561	9.53	2.58
100～ (%)	2 (0.1)	16 (0.7)	92 (3.7)	393 (16.0)	648 (26.3)	672 (27.3)	428 (17.4)	142 (5.8)	68 (2.8)	2,461 (100.0)	13	2,474	10.25	2.74
120～ (%)		33 (0.5)	188 (2.8)	718 (10.8)	1,698 (25.6)	1,982 (29.8)	1,235 (18.6)	549 (8.3)	241 (3.6)	6,644 (100.0)	31	6,675	10.73	2.70
140～ (%)		38 (0.4)	246 (2.5)	955 (9.6)	2,470 (24.7)	3,033 (30.4)	2,055 (20.6)	891 (8.9)	305 (3.1)	9,993 (100.0)	46	10,039	10.86	2.63
160～ (%)		30 (0.4)	147 (2.0)	742 (10.2)	1,788 (24.6)	2,189 (30.1)	1,522 (20.9)	620 (8.5)	229 (3.2)	7,267 (100.0)	22	7,289	10.85	2.61
180～ (%)		4 (0.1)	69 (2.5)	281 (10.3)	715 (26.2)	825 (30.2)	516 (18.9)	231 (8.5)	88 (3.2)	2,729 (100.0)	6	2,735	10.79	2.66
200～ (%)	1 (0.1)	2 (0.3)	15 (2.1)	79 (11.2)	210 (29.8)	206 (29.3)	132 (18.8)	45 (6.4)	14 (2.0)	704 (100.0)	2	706	10.50	2.47
220～ (%)		1 (0.5)	7 (3.8)	23 (12.6)	50 (27.5)	53 (29.1)	28 (15.4)	17 (9.3)	3 (1.6)	182 (100.0)		182	10.43	2.69
合計 (%)	3 (0.0)	129 (0.4)	806 (2.6)	3,338 (10.9)	7,781 (25.4)	9,119 (29.8)	5,984 (19.5)	2,524 (8.2)	959 (3.1)	30,643 (100.0)	129	30,772	10.73	2.66
記載なし (%)		18 (0.5)	112 (3.1)	412 (11.5)	966 (27.0)	1,028 (28.8)	654 (18.3)	296 (8.3)	89 (2.5)	3,575 (100.0)	624	4,199	10.59	2.65
総計 (%)	3 (0.0)	147 (0.4)	918 (2.7)	3,750 (11.0)	8,747 (25.6)	10,147 (29.7)	6,638 (19.4)	2,820 (8.2)	1,048 (3.1)	34,218 (100.0)	753	34,971	10.72	2.66
平均	144.00	144.09	145.24	147.32	150.36	151.13	151.83	152.27	150.25	150.54	142.69	150.50		
標準偏差	48.59	26.78	27.96	27.82	25.87	24.47	23.54	23.14	23.09	25.05	26.70	25.07		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査