

表 2995 クレアチニン濃度(mg/dL) ヘモグロビン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

ヘモグロビン濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)	1 (14.3)			2 (28.6)	3 (42.9)	1 (14.3)				7 (100.0)		7	7.40	3.07
5～ (%)				5 (35.7)	4 (28.6)	1 (7.1)	2 (14.3)	1 (7.1)	1 (7.1)	14 (100.0)		14	9.84	3.12
6～ (%)		1 (3.6)	1 (3.6)	8 (28.6)	9 (32.1)	3 (10.7)	4 (14.3)	2 (7.1)		28 (100.0)		28	9.41	2.96
7～ (%)		4 (3.3)	14 (11.7)	15 (12.5)	27 (22.5)	27 (22.5)	20 (16.7)	8 (6.7)	5 (4.2)	120 (100.0)	4	124	10.00	3.43
8～ (%)		10 (2.9)	28 (8.2)	58 (17.1)	70 (20.6)	58 (17.1)	56 (16.5)	34 (10.0)	26 (7.6)	340 (100.0)	4	344	10.42	3.75
9～ (%)	4 (0.4)	15 (1.7)	69 (7.7)	139 (15.6)	214 (24.0)	182 (20.4)	148 (16.6)	84 (9.4)	38 (4.3)	893 (100.0)	10	903	10.23	3.42
10～ (%)	2 (0.1)	24 (1.4)	139 (8.2)	315 (18.5)	399 (23.5)	354 (20.8)	230 (13.5)	148 (8.7)	88 (5.2)	1,699 (100.0)	7	1,706	10.11	3.45
11～ (%)	4 (0.2)	44 (2.6)	172 (10.1)	336 (19.8)	389 (22.9)	306 (18.0)	236 (13.9)	130 (7.7)	80 (4.7)	1,697 (100.0)	12	1,709	9.76	3.47
12～ (%)	4 (0.5)	26 (3.3)	91 (11.5)	177 (22.4)	163 (20.6)	130 (16.5)	110 (13.9)	52 (6.6)	37 (4.7)	790 (100.0)	6	796	9.47	3.53
13～ (%)	1 (0.4)	16 (6.8)	43 (18.2)	47 (19.9)	47 (19.9)	31 (13.1)	20 (8.5)	19 (8.1)	12 (5.1)	236 (100.0)	1	237	8.91	3.97
14～ (%)	1 (1.3)	7 (8.9)	9 (11.4)	18 (22.8)	16 (20.3)	11 (13.9)	10 (12.7)	2 (2.5)	5 (6.3)	79 (100.0)		79	9.07	4.01
合計 (%)	17 (0.3)	147 (2.5)	566 (9.6)	1,120 (19.0)	1,341 (22.7)	1,104 (18.7)	836 (14.2)	480 (8.1)	292 (4.9)	5,903 (100.0)	44	5,947	9.89	3.52
記載なし (%)		7 (9.9)	9 (12.7)	13 (18.3)	8 (11.3)	11 (15.5)	12 (16.9)	8 (11.3)	3 (4.2)	71 (100.0)	2,923	2,994	9.59	4.04
総計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
平均	11.06	11.27	11.06	10.92	10.76	10.72	10.71	10.68	10.80	10.81	10.33	10.81		
標準偏差	2.31	1.70	1.47	1.44	1.41	1.31	1.41	1.33	1.43	1.41	1.56	1.42		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査