

表 3032 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	3 (0.0)	4 (0.0)	31 (0.2)	132 (1.0)	813 (6.1)	2,571 (19.3)	3,654 (27.4)	2,982 (22.4)	1,767 (13.3)	1,375 (10.3)	13,332 (100.0)	794	14,126	1.60	0.31
慢性腎盂腎炎 (%)	2 (0.5)			3 (0.8)	21 (5.5)	71 (18.7)	94 (24.8)	95 (25.1)	54 (14.2)	39 (10.3)	379 (100.0)	19	398	1.60	0.32
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1 (0.4)				14 (5.9)	31 (13.1)	66 (27.8)	66 (27.8)	35 (14.8)	24 (10.1)	237 (100.0)	13	250	1.62	0.30
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1 (0.3)		1 (0.3)		9 (2.7)	31 (9.3)	62 (18.6)	83 (24.9)	89 (26.6)	58 (17.4)	334 (100.0)	14	348	1.74	0.32
その他の分類不能の腎炎 (%)			1 (0.6)	3 (1.7)	9 (5.1)	23 (12.9)	59 (33.1)	52 (29.2)	17 (9.6)	14 (7.9)	178 (100.0)	8	186	1.59	0.29
多発性嚢胞腎 (%)		1 (0.1)	2 (0.2)	24 (1.9)	113 (9.1)	327 (26.4)	345 (27.8)	255 (20.6)	113 (9.1)	60 (4.8)	1,240 (100.0)	90	1,330	1.51	0.28
腎硬化症 (%)	3 (0.1)	1 (0.0)	6 (0.3)	32 (1.5)	209 (9.7)	525 (24.5)	636 (29.6)	405 (18.9)	198 (9.2)	131 (6.1)	2,146 (100.0)	106	2,252	1.51	0.30
悪性高血圧 (%)			1 (0.4)	9 (3.5)	24 (9.3)	73 (28.4)	68 (26.5)	54 (21.0)	16 (6.2)	12 (4.7)	257 (100.0)	13	270	1.48	0.28
糖尿病性腎症 (%)	6 (0.1)	10 (0.1)	37 (0.4)	347 (3.4)	1,355 (13.3)	2,901 (28.5)	2,769 (27.2)	1,673 (16.5)	680 (6.7)	389 (3.8)	10,167 (100.0)	678	10,845	1.45	0.29
SLE腎炎 (%)				1 (0.3)	14 (4.5)	40 (12.7)	66 (21.0)	79 (25.2)	65 (20.7)	49 (15.6)	314 (100.0)	23	337	1.70	0.33
アミロイド腎 (%)					2 (4.8)	5 (11.9)	15 (35.7)	8 (19.0)	10 (23.8)	2 (4.8)	42 (100.0)	1	43	1.63	0.26
痛風腎 (%)	1 (0.8)			1 (0.8)	15 (11.5)	29 (22.3)	37 (28.5)	32 (24.6)	8 (6.2)	7 (5.4)	130 (100.0)	12	142	1.50	0.30
先天性代謝異常による腎不全 (%)			1 (2.9)	1 (2.9)	1 (2.9)	2 (5.7)	6 (17.1)	13 (37.1)	5 (14.3)	6 (17.1)	35 (100.0)	6	41	1.68	0.34
腎・尿路結核 (%)					1 (5.3)	5 (26.3)	4 (21.1)	4 (21.1)	2 (10.5)	3 (15.8)	19 (100.0)	1	20	1.62	0.29
腎・尿路結石 (%)				1 (1.6)	6 (9.5)	20 (31.7)	14 (22.2)	12 (19.0)	7 (11.1)	3 (4.8)	63 (100.0)	1	64	1.50	0.26
腎・尿路腫瘍 (%)				2 (3.4)	5 (8.5)	18 (30.5)	11 (18.6)	14 (23.7)	5 (8.5)	4 (6.8)	59 (100.0)	3	62	1.50	0.30
閉塞性尿路障害 (%)					4 (6.3)	15 (23.4)	15 (23.4)	14 (21.9)	10 (15.6)	6 (9.4)	64 (100.0)	5	69	1.60	0.31
骨髄腫 (%)					2 (18.2)	4 (36.4)	4 (36.4)	1 (9.1)			11 (100.0)		11	1.38	0.18
腎形成不全 (%)				1 (1.1)	4 (4.4)	15 (16.7)	27 (30.0)	20 (22.2)	13 (14.4)	10 (11.1)	90 (100.0)	5	95	1.62	0.32
不明 (%)	2 (0.1)	3 (0.1)	4 (0.1)	43 (1.6)	219 (8.0)	587 (21.5)	734 (26.8)	586 (21.4)	306 (11.2)	250 (9.1)	2,734 (100.0)	220	2,954	1.56	0.31
再導入 (%)				4 (1.1)	19 (5.2)	74 (20.2)	94 (25.6)	84 (22.9)	47 (12.8)	45 (12.3)	367 (100.0)	18	385	1.63	0.34
その他 (%)				14 (2.0)	57 (7.9)	139 (19.4)	192 (26.8)	141 (19.7)	93 (13.0)	81 (11.3)	717 (100.0)	26	743	1.58	0.33
合計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	2,056	34,971	1.54	0.31
記載なし (%)															
総計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	2,056	34,971	1.54	0.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査