表 3066　equilibrated Kt/V（eKt/V）　nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

| nPCR | 0.4未満 | 0.4～ | 0.6～ | 0.8～ | 1.0～ | 1.2～ | 1.4～ | 1.6～ | 1.8～ | 2.0～ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4未満 | 16 | 5 | 13 | 29 | 25 | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | 131 | | 131 | 0.98 | 0.42 |
| （%） | (12.2) | (3.8) | (9.9) | (22.1) | (19.1) | (19.8) | (7.6) | (3.1) | (1.5) | (0.8) | (100.0) | | | | |
| 0.4～ | 13 | 51 | 167 | 444 | 701 | 756 | 495 | 221 | 74 | 40 | 2,962 | 1 | 2,963 | 1.23 | 0.32 |
| （%） | (0.4) | (1.7) | (5.6) | (15.0) | (23.7) | (25.5) | (16.7) | (7.5) | (2.5) | (1.4) | (100.0) | | | | |
| 0.6～ | 2 | 39 | 281 | 1,386 | 3,452 | 5,000 | 3,981 | 1,879 | 540 | 257 | 16,817 | 6 | 16,823 | 1.33 | 0.28 |
| （%） | (0.0) | (0.2) | (1.7) | (8.2) | (20.5) | (29.7) | (23.7) | (11.2) | (3.2) | (1.5) | (100.0) | | | | |
| 0.8～ | | 11 | 118 | 913 | 3,736 | 7,475 | 7,426 | 3,813 | 1,334 | 693 | 25,519 | 17 | 25,536 | 1.42 | 0.27 |
| （%） | | (0.0) | (0.5) | (3.6) | (14.6) | (29.3) | (29.1) | (14.9) | (5.2) | (2.7) | (100.0) | | | | |
| 1.0～ | | 1 | 16 | 188 | 1,098 | 2,975 | 3,849 | 2,434 | 951 | 608 | 12,120 | 26 | 12,146 | 1.51 | 0.28 |
| （%） | | (0.0) | (0.1) | (1.6) | (9.1) | (24.5) | (31.8) | (20.1) | (7.8) | (5.0) | (100.0) | | | | |
| 1.2～ | | | 2 | 22 | 143 | 454 | 797 | 585 | 276 | 198 | 2,477 | 11 | 2,488 | 1.58 | 0.29 |
| （%） | | | (0.1) | (0.9) | (5.8) | (18.3) | (32.2) | (23.6) | (11.1) | (8.0) | (100.0) | | | | |
| 1.4～ | | | | 2 | 15 | 43 | 64 | 74 | 45 | 31 | 274 | 9 | 283 | 1.64 | 0.32 |
| （%） | | | | (0.7) | (5.5) | (15.7) | (23.4) | (27.0) | (16.4) | (11.3) | (100.0) | | | | |
| 1.6～ | | | | 1 | | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 42 | 3 | 45 | 1.72 | 0.37 |
| （%） | | | | (2.4) | | (11.9) | (21.4) | (23.8) | (23.8) | (16.7) | (100.0) | | | | |
| 1.8～ | | | | | | | 2 | 2 | | 4 | 8 | 3 | 11 | 2.02 | 0.53 |
| （%） | | | | | | | (25.0) | (25.0) | | (50.0) | (100.0) | | | | |
| 2.0～ | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1.76 | 0.64 |
| （%） | | | | (20.0) | | | (20.0) | | (20.0) | (40.0) | (100.0) | | | | |
| 合計 | 31 | 107 | 597 | 2,986 | 9,170 | 16,734 | 16,634 | 9,022 | 3,233 | 1,841 | 60,355 | 81 | 60,436 | 1.41 | 0.29 |
| （%） | (0.1) | (0.2) | (1.0) | (4.9) | (15.2) | (27.7) | (27.6) | (14.9) | (5.4) | (3.1) | (100.0) | | | | |
| 記載なし | | | | | | | | | | | | 5,258 | 5,258 | | |
| （%） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総計 | 31 | 107 | 597 | 2,986 | 9,170 | 16,734 | 16,634 | 9,022 | 3,233 | 1,841 | 60,355 | 5,339 | 65,694 | 1.41 | 0.29 |
| （%） | (0.1) | (0.2) | (1.0) | (4.9) | (15.2) | (27.7) | (27.6) | (14.9) | (5.4) | (3.1) | (100.0) | | | | |
| 平均 | 0.42 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.88 | 1.21 | 0.88 | | |
| 標準偏差 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.39 | 0.18 | | |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査