

表 3086 equilibrated Kt/V(eKt/V) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	3 (0.0)	17 (0.1)	83 (0.6)	548 (4.1)	2,470 (18.5)	4,134 (31.0)	3,224 (24.2)	1,683 (12.6)	679 (5.1)	501 (3.8)	13,342 (100.0)	784	14,126	1.40	0.29
慢性腎盂腎炎 （％）	2 (0.5)		2 (0.5)	14 (3.7)	72 (19.0)	101 (26.6)	105 (27.7)	45 (11.9)	24 (6.3)	14 (3.7)	379 (100.0)	19	398	1.40	0.29
急速進行性糸球 体腎炎 （％）	1 (0.4)			9 (3.8)	33 (13.9)	72 (30.4)	71 (30.0)	31 (13.1)	16 (6.8)	4 (1.7)	237 (100.0)	13	250	1.41	0.27
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）	1 (0.3)	1 (0.3)		7 (2.1)	28 (8.4)	70 (21.0)	96 (28.7)	83 (24.9)	29 (8.7)	19 (5.7)	334 (100.0)	14	348	1.53	0.29
その他の分類不 能の腎炎 （％）			4 (2.2)	8 (4.5)	22 (12.4)	60 (33.7)	54 (30.3)	17 (9.6)	9 (5.1)	4 (2.2)	178 (100.0)	8	186	1.39	0.27
多発性嚢胞腎 （％）		2 (0.2)	8 (0.6)	82 (6.6)	335 (27.0)	398 (32.1)	260 (21.0)	101 (8.1)	32 (2.6)	22 (1.8)	1,240 (100.0)	90	1,330	1.32	0.26
腎硬化症 （％）	3 (0.1)	5 (0.2)	19 (0.9)	159 (7.4)	530 (24.7)	713 (33.2)	427 (19.9)	181 (8.4)	70 (3.3)	39 (1.8)	2,146 (100.0)	106	2,252	1.32	0.27
悪性高血圧 （％）			5 (1.9)	16 (6.2)	75 (29.1)	83 (32.2)	54 (20.9)	12 (4.7)	9 (3.5)	4 (1.6)	258 (100.0)	12	270	1.30	0.27
糖尿病性腎症 （％）	7 (0.1)	15 (0.1)	181 (1.8)	1,092 (10.7)	2,977 (29.3)	3,166 (31.1)	1,759 (17.3)	656 (6.4)	192 (1.9)	129 (1.3)	10,174 (100.0)	671	10,845	1.26	0.26
SLE腎炎 （％）				12 (3.8)	43 (13.7)	72 (22.9)	83 (26.3)	65 (20.6)	16 (5.1)	24 (7.6)	315 (100.0)	22	337	1.49	0.32
アミロイド腎 （％）				1 (2.4)	6 (14.3)	16 (38.1)	11 (26.2)	6 (14.3)	1 (2.4)	1 (2.4)	42 (100.0)	1	43	1.41	0.24
痛風腎 （％）	1 (0.8)		1 (0.8)	11 (8.5)	31 (23.8)	41 (31.5)	30 (23.1)	10 (7.7)	2 (1.5)	3 (2.3)	130 (100.0)	12	142	1.31	0.28
先天性代謝異常 による腎不全 （％）			1 (2.9)	1 (2.9)	3 (8.6)	6 (17.1)	15 (42.9)	4 (11.4)	4 (11.4)	1 (2.9)	35 (100.0)	6	41	1.47	0.30
腎・尿路結核 （％）						5 (26.3)	5 (26.3)	4 (21.1)	3 (15.8)	2 (10.5)	19 (100.0)	1	20	1.41	0.27
腎・尿路結石 （％）				7 (11.1)	16 (25.4)	18 (28.6)	16 (25.4)	3 (4.8)	3 (4.8)		63 (100.0)	1	64	1.31	0.24
腎・尿路腫瘍 （％）			1 (1.7)	7 (11.9)	15 (25.4)	13 (22.0)	16 (27.1)	3 (5.1)	3 (5.1)	1 (1.7)	59 (100.0)	3	62	1.32	0.28
閉塞性尿路障害 （％）				3 (4.7)	15 (23.4)	18 (28.1)	13 (20.3)	11 (17.2)	1 (1.6)	3 (4.7)	64 (100.0)	5	69	1.40	0.29
骨髄腫 （％）				2 (18.2)	3 (27.3)	4 (36.4)	2 (18.2)				11 (100.0)		11	1.19	0.18
腎形成不全 （％）			1 (1.1)	2 (2.2)	17 (18.7)	27 (29.7)	22 (24.2)	12 (13.2)	6 (6.6)	4 (4.4)	91 (100.0)	4	95	1.44	0.32
不明 （％）	2 (0.1)	4 (0.1)	21 (0.8)	177 (6.5)	580 (21.2)	817 (29.9)	625 (22.8)	305 (11.1)	132 (4.8)	73 (2.7)	2,736 (100.0)	218	2,954	1.36	0.29
再導入 （％）			2 (0.5)	10 (2.7)	76 (20.8)	103 (28.1)	86 (23.5)	50 (13.7)	19 (5.2)	20 (5.5)	366 (100.0)	19	385	1.43	0.31
その他 （％）			7 (1.0)	43 (6.0)	150 (20.9)	202 (28.2)	157 (21.9)	91 (12.7)	43 (6.0)	24 (3.3)	717 (100.0)	26	743	1.38	0.30
合計 （％）	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,211 (6.7)	7,502 (22.8)	10,139 (30.8)	7,130 (21.6)	3,372 (10.2)	1,292 (3.9)	890 (2.7)	32,936 (100.0)	2,035	34,971	1.35	0.29
記載なし （％）															
総計 （％）	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,211 (6.7)	7,502 (22.8)	10,139 (30.8)	7,130 (21.6)	3,372 (10.2)	1,292 (3.9)	890 (2.7)	32,936 (100.0)	2,035	34,971	1.35	0.29

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査