

表 3165 %クレアチニン産生速度(%) 透析後体重(kg)別 (施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)										2 (100.0)	2 (100.0)	27	29	165.00	8.06
20～ (%)	252 (44.0)	72 (12.6)	58 (10.1)	65 (11.3)	45 (7.9)	34 (5.9)	23 (4.0)	12 (2.1)	5 (0.9)	7 (1.2)	573 (100.0)	56	629	67.10	30.06
30～ (%)	2,051 (16.6)	1,026 (8.3)	1,339 (10.8)	1,623 (13.1)	1,780 (14.4)	1,680 (13.6)	1,388 (11.2)	861 (6.9)	412 (3.3)	232 (1.9)	12,392 (100.0)	841	13,233	88.40	28.14
40～ (%)	1,781 (6.9)	1,332 (5.1)	2,090 (8.1)	2,965 (11.4)	3,836 (14.8)	4,335 (16.7)	3,925 (15.1)	3,040 (11.7)	1,592 (6.1)	1,024 (4.0)	25,920 (100.0)	1,508	27,428	100.02	25.57
50～ (%)	694 (4.8)	571 (4.0)	1,006 (7.0)	1,566 (10.9)	2,098 (14.6)	2,484 (17.2)	2,418 (16.8)	1,813 (12.6)	1,065 (7.4)	701 (4.9)	14,416 (100.0)	791	15,207	103.42	24.28
60～ (%)	230 (4.7)	245 (5.0)	353 (7.1)	606 (12.3)	770 (15.6)	848 (17.2)	742 (15.0)	581 (11.8)	324 (6.6)	240 (4.9)	4,939 (100.0)	255	5,194	102.10	24.56
70～ (%)	76 (5.1)	58 (3.9)	126 (8.5)	197 (13.3)	230 (15.5)	274 (18.5)	219 (14.8)	148 (10.0)	83 (5.6)	70 (4.7)	1,481 (100.0)	76	1,557	101.07	24.60
80～ (%)	25 (5.4)	25 (5.4)	50 (10.8)	63 (13.6)	80 (17.3)	82 (17.7)	56 (12.1)	47 (10.2)	22 (4.8)	12 (2.6)	462 (100.0)	39	501	97.83	24.00
90～ (%)	7 (4.6)	6 (3.9)	15 (9.9)	28 (18.4)	27 (17.8)	30 (19.7)	14 (9.2)	14 (9.2)	4 (2.6)	7 (4.6)	152 (100.0)	8	160	97.80	22.99
100～ (%)	5 (14.7)	2 (5.9)	4 (11.8)	6 (17.6)	2 (5.9)	6 (17.6)	4 (11.8)	3 (8.8)		2 (5.9)	34 (100.0)		34	92.69	28.37
110～ (%)	3 (17.6)	2 (11.8)	2 (11.8)	4 (23.5)	1 (5.9)	4 (23.5)			1 (5.9)		17 (100.0)		17	80.32	30.39
120～ (%)	2 (22.2)		2 (22.2)	1 (11.1)			2 (22.2)		1 (11.1)	1 (11.1)	9 (100.0)		9	94.34	35.13
合計 (%)	5,126 (8.5)	3,339 (5.5)	5,045 (8.4)	7,124 (11.8)	8,869 (14.7)	9,777 (16.2)	8,791 (14.6)	6,519 (10.8)	3,509 (5.8)	2,298 (3.8)	60,397 (100.0)	3,601	63,998	98.30	26.49
記載なし (%)												1,696	1,696		
総計 (%)	5,126 (8.5)	3,339 (5.5)	5,045 (8.4)	7,124 (11.8)	8,869 (14.7)	9,777 (16.2)	8,791 (14.6)	6,519 (10.8)	3,509 (5.8)	2,298 (3.8)	60,397 (100.0)	5,297	65,694	98.30	26.49
平均	43.02	45.59	46.88	47.86	48.20	48.79	48.88	49.30	49.60	50.30	47.94	46.77	47.87		
標準偏差	10.64	10.78	11.02	11.04	10.40	10.27	9.69	9.52	9.21	9.85	10.44	11.03	10.47		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査