

表 3188 %クレアチニン産生速度(%) 透析前CRP濃度(mg/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前CRP濃度	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.2未満	584	551	1,084	1,850	2,638	3,289	3,141	2,347	1,285	760	17,529	552	18,081	104.97	22.50
(%)	(3.3)	(3.1)	(6.2)	(10.6)	(15.0)	(18.8)	(17.9)	(13.4)	(7.3)	(4.3)	(100.0)				
0.2～	310	262	471	720	859	945	850	596	303	207	5,523	207	5,730	100.19	24.10
(%)	(5.6)	(4.7)	(8.5)	(13.0)	(15.6)	(17.1)	(15.4)	(10.8)	(5.5)	(3.7)	(100.0)				
0.5～	164	168	233	378	451	423	398	224	144	98	2,681	89	2,770	98.21	24.68
(%)	(6.1)	(6.3)	(8.7)	(14.1)	(16.8)	(15.8)	(14.8)	(8.4)	(5.4)	(3.7)	(100.0)				
1.0～	155	122	208	230	274	265	195	132	75	55	1,711	55	1,766	94.57	26.24
(%)	(9.1)	(7.1)	(12.2)	(13.4)	(16.0)	(15.5)	(11.4)	(7.7)	(4.4)	(3.2)	(100.0)				
2.0～	132	85	107	153	141	128	100	58	30	26	960	47	1,007	89.31	26.78
(%)	(13.8)	(8.9)	(11.1)	(15.9)	(14.7)	(13.3)	(10.4)	(6.0)	(3.1)	(2.7)	(100.0)				
4.0～	53	36	44	51	49	42	35	13	10	5	338	17	355	85.98	26.33
(%)	(15.7)	(10.7)	(13.0)	(15.1)	(14.5)	(12.4)	(10.4)	(3.8)	(3.0)	(1.5)	(100.0)				
6.0～	24	18	20	19	17	18	11	6	6	4	143	7	150	86.48	27.35
(%)	(16.8)	(12.6)	(14.0)	(13.3)	(11.9)	(12.6)	(7.7)	(4.2)	(4.2)	(2.8)	(100.0)				
8.0～	15	6	9	13	12	6	9	2	2	1	75	10	85	84.52	27.51
(%)	(20.0)	(8.0)	(12.0)	(17.3)	(16.0)	(8.0)	(12.0)	(2.7)	(2.7)	(1.3)	(100.0)				
10.0～	12	7	10	18	10	11	7	5	1		81	10	91	84.60	25.63
(%)	(14.8)	(8.6)	(12.3)	(22.2)	(12.3)	(13.6)	(8.6)	(6.2)	(1.2)		(100.0)				
15.0～	13	5	11	14	8	10	5	3	1		70	5	75	83.29	23.88
(%)	(18.6)	(7.1)	(15.7)	(20.0)	(11.4)	(14.3)	(7.1)	(4.3)	(1.4)		(100.0)				
合計	1,462	1,260	2,197	3,446	4,459	5,137	4,751	3,386	1,857	1,156	29,111	999	30,110	101.84	23.97
(%)	(5.0)	(4.3)	(7.5)	(11.8)	(15.3)	(17.6)	(16.3)	(11.6)	(6.4)	(4.0)	(100.0)				
記載なし	172	144	281	422	641	697	648	457	235	152	3,849	1,012	4,861	102.54	23.16
(%)	(4.5)	(3.7)	(7.3)	(11.0)	(16.7)	(18.1)	(16.8)	(11.9)	(6.1)	(3.9)	(100.0)				
総計	1,634	1,404	2,478	3,868	5,100	5,834	5,399	3,843	2,092	1,308	32,960	2,011	34,971	101.92	23.87
(%)	(5.0)	(4.3)	(7.5)	(11.7)	(15.5)	(17.7)	(16.4)	(11.7)	(6.3)	(4.0)	(100.0)				
平均	1.25	0.97	0.79	0.70	0.53	0.44	0.38	0.35	0.32	0.34	0.54	0.83	0.55		
標準偏差	2.74	2.36	1.94	2.11	1.69	1.37	1.12	1.85	0.87	0.73	1.71	2.39	1.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査