

表 3258 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	1 (2.9)		1 (2.9)	8 (22.9)	8 (22.9)	13 (37.1)	4 (11.4)			35 (100.0)		35	3.29	0.57
60～ (%)	4 (1.5)	11 (4.2)	14 (5.4)	39 (15.0)	78 (30.0)	91 (35.0)	22 (8.5)	1 (0.4)		260 (100.0)	11	271	3.24	0.65
80～ (%)	10 (0.4)	43 (1.8)	127 (5.5)	316 (13.6)	777 (33.4)	844 (36.3)	198 (8.5)	10 (0.4)	2 (0.1)	2,327 (100.0)	50	2,377	3.32	0.55
100～ (%)	20 (0.2)	149 (1.2)	397 (3.1)	1,298 (10.1)	3,859 (30.0)	5,583 (43.4)	1,494 (11.6)	64 (0.5)	7 (0.1)	12,871 (100.0)	284	13,155	3.44	0.50
120～ (%)	32 (0.1)	171 (0.4)	739 (1.8)	2,718 (6.7)	10,631 (26.1)	19,684 (48.3)	6,385 (15.7)	341 (0.8)	23 (0.1)	40,724 (100.0)	852	41,576	3.55	0.45
140～ (%)	26 (0.0)	160 (0.3)	762 (1.2)	3,084 (4.9)	14,774 (23.5)	31,541 (50.1)	11,876 (18.9)	672 (1.1)	57 (0.1)	62,952 (100.0)	1,251	64,203	3.62	0.43
160～ (%)	20 (0.0)	97 (0.2)	472 (1.0)	2,098 (4.6)	10,031 (21.8)	23,057 (50.1)	9,597 (20.9)	575 (1.3)	36 (0.1)	45,983 (100.0)	860	46,843	3.64	0.42
180～ (%)	9 (0.1)	32 (0.2)	167 (0.9)	787 (4.5)	3,833 (21.7)	8,699 (49.2)	3,889 (22.0)	244 (1.4)	6 (0.0)	17,666 (100.0)	336	18,002	3.65	0.42
200～ (%)	2 (0.0)	4 (0.1)	37 (0.8)	181 (4.1)	908 (20.5)	2,205 (49.7)	1,020 (23.0)	75 (1.7)	5 (0.1)	4,437 (100.0)	78	4,515	3.67	0.42
220～ (%)			6 (0.7)	37 (4.3)	183 (21.1)	413 (47.6)	210 (24.2)	18 (2.1)		867 (100.0)	27	894	3.68	0.41
合計 (%)	124 (0.1)	667 (0.4)	2,722 (1.4)	10,566 (5.6)	45,082 (24.0)	92,130 (49.0)	34,695 (18.4)	2,000 (1.1)	136 (0.1)	188,122 (100.0)	3,749	191,871	3.60	0.44
記載なし (%)	22 (0.1)	104 (0.3)	457 (1.5)	1,584 (5.2)	7,000 (23.0)	15,005 (49.4)	5,811 (19.1)	362 (1.2)	36 (0.1)	30,381 (100.0)	6,719	37,100	3.61	0.45
総計 (%)	146 (0.1)	771 (0.4)	3,179 (1.5)	12,150 (5.6)	52,082 (23.8)	107,135 (49.0)	40,506 (18.5)	2,362 (1.1)	172 (0.1)	218,503 (100.0)	10,468	228,971	3.60	0.44
平均	135.34	134.88	141.79	145.22	149.26	152.43	155.52	157.67	152.38	151.67	150.46	151.64		
標準偏差	30.96	26.88	26.33	25.99	24.42	23.40	23.07	23.21	21.50	24.01	24.48	24.02		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査