

表 3267 透析前アルブミン濃度(g/dL) 透析前CRP濃度(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.2未満 (%)	2 (0.0)	7 (0.0)	33 (0.2)	256 (1.2)	3,578 (17.3)	11,722 (56.8)	4,803 (23.3)	238 (1.2)	12 (0.1)	20,651 (100.0)	53	20,704	3.73	0.34
0.2～ (%)	1 (0.0)	8 (0.1)	33 (0.5)	221 (3.4)	1,693 (26.3)	3,495 (54.2)	963 (14.9)	32 (0.5)	2 (0.0)	6,448 (100.0)	29	6,477	3.60	0.36
0.5～ (%)		4 (0.1)	33 (1.0)	194 (6.2)	1,009 (32.0)	1,549 (49.1)	357 (11.3)	7 (0.2)	1 (0.0)	3,154 (100.0)	19	3,173	3.52	0.38
1.0～ (%)	2 (0.1)	9 (0.5)	45 (2.3)	228 (11.4)	719 (36.0)	837 (42.0)	150 (7.5)	4 (0.2)	1 (0.1)	1,995 (100.0)	8	2,003	3.40	0.44
2.0～ (%)	2 (0.2)	9 (0.8)	60 (5.4)	155 (13.9)	439 (39.2)	394 (35.2)	59 (5.3)	1 (0.1)		1,119 (100.0)	15	1,134	3.30	0.47
4.0～ (%)	1 (0.2)	5 (1.2)	23 (5.7)	71 (17.6)	173 (42.9)	109 (27.0)	20 (5.0)	1 (0.2)		403 (100.0)	4	407	3.22	0.50
6.0～ (%)		6 (3.6)	13 (7.7)	34 (20.1)	65 (38.5)	43 (25.4)	7 (4.1)	1 (0.6)		169 (100.0)	2	171	3.16	0.55
8.0～ (%)	2 (2.2)	3 (3.3)	10 (11.0)	20 (22.0)	31 (34.1)	21 (23.1)	3 (3.3)	1 (1.1)		91 (100.0)	3	94	3.05	0.63
10.0～ (%)		5 (4.8)	14 (13.5)	22 (21.2)	39 (37.5)	22 (21.2)	2 (1.9)			104 (100.0)	4	108	3.04	0.57
15.0～ (%)		2 (2.5)	13 (16.5)	21 (26.6)	24 (30.4)	17 (21.5)	2 (2.5)			79 (100.0)	5	84	2.98	0.60
合計 (%)	10 (0.0)	58 (0.2)	277 (0.8)	1,222 (3.6)	7,770 (22.7)	18,209 (53.2)	6,366 (18.6)	285 (0.8)	16 (0.0)	34,213 (100.0)	142	34,355	3.64	0.39
記載なし (%)		4 (0.1)	17 (0.4)	170 (3.8)	1,037 (23.4)	2,376 (53.6)	792 (17.9)	32 (0.7)	2 (0.0)	4,430 (100.0)	1,161	5,591	3.64	0.38
総計 (%)	10 (0.0)	62 (0.2)	294 (0.8)	1,392 (3.6)	8,807 (22.8)	20,585 (53.3)	7,158 (18.5)	317 (0.8)	18 (0.0)	38,643 (100.0)	1,303	39,946	3.64	0.39
平均	3.53	4.38	3.74	1.99	0.83	0.38	0.23	0.20	0.24	0.54	2.63	0.55		
標準偏差	3.71	6.26	5.25	3.37	2.20	1.19	0.67	0.77	0.41	1.70	7.24	1.76		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査