

表 3279 アルブミン濃度(g/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	9 (0.2)	43 (1.1)	168 (4.4)	658 (17.3)	1,398 (36.8)	1,210 (31.9)	290 (7.6)	19 (0.5)	1 (0.0)	3,796 (100.0)	1,946	5,742	3.29	0.51
女性 (%)	6 (0.3)	28 (1.3)	130 (6.1)	379 (17.7)	760 (35.5)	696 (32.5)	141 (6.6)	2 (0.1)	1 (0.0)	2,143 (100.0)	1,056	3,199	3.25	0.53
合計 (%)	15 (0.3)	71 (1.2)	298 (5.0)	1,037 (17.5)	2,158 (36.3)	1,906 (32.1)	431 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,939 (100.0)	3,002	8,941	3.28	0.52
記載なし (%)														
総計 (%)	15 (0.3)	71 (1.2)	298 (5.0)	1,037 (17.5)	2,158 (36.3)	1,906 (32.1)	431 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,939 (100.0)	3,002	8,941	3.28	0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査