

表 3285 アルブミン濃度(g/dL) CRP濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

CRP濃度	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.2未満 (%)	1 (0.0)	7 (0.2)	65 (2.1)	420 (13.8)	1,135 (37.3)	1,164 (38.3)	233 (7.7)	16 (0.5)	1 (0.0)	3,042 (100.0)	25	3,067	3.38	0.45
0.2～ (%)	2 (0.2)	8 (0.8)	41 (4.2)	201 (20.4)	365 (37.1)	282 (28.7)	82 (8.3)	2 (0.2)	1 (0.1)	984 (100.0)	11	995	3.26	0.51
0.5～ (%)	2 (0.5)	4 (0.9)	38 (8.6)	96 (21.7)	168 (38.0)	106 (24.0)	28 (6.3)			442 (100.0)	7	449	3.16	0.53
1.0～ (%)		15 (4.9)	36 (11.8)	93 (30.5)	81 (26.6)	67 (22.0)	13 (4.3)			305 (100.0)	3	308	3.01	0.58
2.0～ (%)	1 (0.5)	11 (5.6)	32 (16.2)	55 (27.8)	62 (31.3)	32 (16.2)	5 (2.5)			198 (100.0)	4	202	2.91	0.59
4.0～ (%)	3 (3.8)	4 (5.0)	21 (26.3)	19 (23.8)	19 (23.8)	11 (13.8)	3 (3.8)			80 (100.0)	3	83	2.75	0.69
6.0～ (%)	1 (2.6)	4 (10.3)	10 (25.6)	15 (38.5)	5 (12.8)	3 (7.7)	1 (2.6)			39 (100.0)	1	40	2.63	0.60
8.0～ (%)		1 (4.2)	7 (29.2)	6 (25.0)	8 (33.3)	2 (8.3)				24 (100.0)		24	2.80	0.55
10.0～ (%)		3 (9.1)	10 (30.3)	6 (18.2)	11 (33.3)	3 (9.1)				33 (100.0)	1	34	2.75	0.59
15.0～ (%)		4 (57.1)	2 (28.6)		1 (14.3)					7 (100.0)		7	2.11	0.42
合計 (%)	10 (0.2)	61 (1.2)	262 (5.1)	911 (17.7)	1,855 (36.0)	1,670 (32.4)	365 (7.1)	18 (0.3)	2 (0.0)	5,154 (100.0)	55	5,209	3.28	0.52
記載なし (%)	5 (0.6)	10 (1.3)	36 (4.6)	126 (16.1)	303 (38.6)	236 (30.1)	66 (8.4)	3 (0.4)		785 (100.0)	2,947	3,732	3.28	0.53
総計 (%)	15 (0.3)	71 (1.2)	298 (5.0)	1,037 (17.5)	2,158 (36.3)	1,906 (32.1)	431 (7.3)	21 (0.4)	2 (0.0)	5,939 (100.0)	3,002	8,941	3.28	0.52
平均	2.55	4.07	2.15	0.85	0.51	0.33	0.30	0.09	0.19	0.62	1.02	0.63		
標準偏差	2.48	6.87	3.09	1.68	1.47	0.88	0.68	0.06	0.16	1.71	1.95	1.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査