

表 3401 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				4 (6.2)	3 (4.6)	16 (24.6)	14 (21.5)	17 (26.2)	2 (3.1)	6 (9.2)	2 (3.1)	1 (1.5)			65 (100.0)	2	67	9.31	0.69
20～ (%)	2 (0.3)	2 (0.3)	20 (3.4)	42 (7.1)	10 (1.7)	126 (21.2)	155 (26.1)	118 (19.8)	15 (2.5)	56 (9.4)	26 (4.4)	12 (2.0)	7 (1.2)	4 (0.7)	595 (100.0)	17	612	9.33	0.85
40～ (%)	53 (0.3)	91 (0.6)	337 (2.1)	1,159 (7.3)	341 (2.1)	3,950 (24.8)	4,717 (29.6)	3,084 (19.4)	385 (2.4)	1,002 (6.3)	489 (3.1)	195 (1.2)	72 (0.5)	43 (0.3)	15,918 (100.0)	439	16,357	9.20	0.75
60～ (%)	332 (0.4)	491 (0.6)	1,968 (2.2)	6,538 (7.5)	1,837 (2.1)	22,409 (25.6)	26,531 (30.3)	16,702 (19.1)	2,048 (2.3)	5,054 (5.8)	2,377 (2.7)	819 (0.9)	305 (0.3)	209 (0.2)	87,620 (100.0)	2,005	89,625	9.17	0.73
80～ (%)	182 (0.4)	252 (0.5)	972 (2.1)	3,455 (7.5)	985 (2.1)	11,218 (24.5)	13,936 (30.4)	8,968 (19.5)	1,137 (2.5)	2,769 (6.0)	1,376 (3.0)	397 (0.9)	137 (0.3)	93 (0.2)	45,877 (100.0)	963	46,840	9.18	0.72
90～ (%)	94 (0.4)	155 (0.6)	537 (2.2)	1,753 (7.2)	573 (2.3)	5,866 (24.0)	7,238 (29.6)	4,963 (20.3)	612 (2.5)	1,551 (6.3)	762 (3.1)	236 (1.0)	78 (0.3)	61 (0.2)	24,479 (100.0)	469	24,948	9.20	0.74
100～ (%)	48 (0.4)	81 (0.7)	283 (2.4)	878 (7.4)	245 (2.1)	2,786 (23.4)	3,529 (29.6)	2,420 (20.3)	287 (2.4)	786 (6.6)	396 (3.3)	121 (1.0)	40 (0.3)	29 (0.2)	11,929 (100.0)	213	12,142	9.21	0.75
120～ (%)	9 (1.2)	5 (0.7)	28 (3.8)	59 (8.0)	16 (2.2)	178 (24.3)	188 (25.6)	142 (19.4)	24 (3.3)	47 (6.4)	15 (2.0)	15 (2.0)	6 (0.8)	1 (0.1)	733 (100.0)	8	741	9.16	0.84
140～ (%)		1 (1.9)	3 (5.7)	6 (11.3)		9 (17.0)	18 (34.0)	9 (17.0)		3 (5.7)	1 (1.9)	3 (5.7)			53 (100.0)	4	57	9.20	0.84
合計 (%)	720 (0.4)	1,078 (0.6)	4,148 (2.2)	13,894 (7.4)	4,010 (2.1)	46,558 (24.9)	56,326 (30.1)	36,423 (19.4)	4,510 (2.4)	11,274 (6.0)	5,444 (2.9)	1,799 (1.0)	645 (0.3)	440 (0.2)	187,269 (100.0)	4,120	191,389	9.18	0.73
記載なし (%)	154 (0.5)	188 (0.6)	823 (2.7)	2,396 (7.8)	666 (2.2)	7,344 (23.9)	8,910 (28.9)	5,981 (19.4)	717 (2.3)	2,003 (6.5)	1,009 (3.3)	366 (1.2)	124 (0.4)	99 (0.3)	30,780 (100.0)	6,802	37,582	9.19	0.78
総計 (%)	874 (0.4)	1,266 (0.6)	4,971 (2.3)	16,290 (7.5)	4,676 (2.1)	53,902 (24.7)	65,236 (29.9)	42,404 (19.4)	5,227 (2.4)	13,277 (6.1)	6,453 (3.0)	2,165 (1.0)	769 (0.4)	539 (0.2)	218,049 (100.0)	10,922	228,971	9.18	0.74
平均	78.33	78.48	77.85	77.64	77.69	77.30	77.57	77.84	77.82	77.81	77.96	77.04	75.87	76.71	77.60	75.82	77.56		
標準偏差	14.41	14.53	14.64	14.32	14.44	14.15	14.20	14.52	14.51	14.91	14.92	16.06	16.07	15.80	14.38	14.66	14.39		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査