

表 3403 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	7.0未満	7.0～	7.5～	8.0～	8.4～	8.5～	9.0～	9.5～	10.0～	10.1～	10.5～	11.0～	11.5～	12.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	107	172	617	1,944	554	6,221	7,214	4,545	546	1,411	659	217	72	40	24,319	875	25,194	9.15	0.74
(%)	(0.4)	(0.7)	(2.5)	(8.0)	(2.3)	(25.6)	(29.7)	(18.7)	(2.2)	(5.8)	(2.7)	(0.9)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				
女性	53	87	334	924	264	3,080	4,301	3,067	357	1,041	511	166	60	31	14,276	476	14,752	9.25	0.75
(%)	(0.4)	(0.6)	(2.3)	(6.5)	(1.8)	(21.6)	(30.1)	(21.5)	(2.5)	(7.3)	(3.6)	(1.2)	(0.4)	(0.2)	(100.0)				
合計	160	259	951	2,868	818	9,301	11,515	7,612	903	2,452	1,170	383	132	71	38,595	1,351	39,946	9.19	0.75
(%)	(0.4)	(0.7)	(2.5)	(7.4)	(2.1)	(24.1)	(29.8)	(19.7)	(2.3)	(6.4)	(3.0)	(1.0)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				
記載なし																			
(%)																			
総計	160	259	951	2,868	818	9,301	11,515	7,612	903	2,452	1,170	383	132	71	38,595	1,351	39,946	9.19	0.75
(%)	(0.4)	(0.7)	(2.5)	(7.4)	(2.1)	(24.1)	(29.8)	(19.7)	(2.3)	(6.4)	(3.0)	(1.0)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査