

表 3581 PTH値(pg/mL) 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:whole-PTH

透析前収縮期血圧	20未満	20～	35～	50～	75～	100～	125～	150～	151～	180～	210～	240～	300～	350～	400～	500～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)					1 (33.3)				1 (33.3)						1 (33.3)		3 (100.0)	1	4	242.00	205.16
60～ (%)	3 (15.8)	6 (31.6)	1 (5.3)	4 (21.1)	2 (10.5)	3 (15.8)											19 (100.0)		19	51.79	36.70
80～ (%)	19 (13.1)	16 (11.0)	14 (9.7)	20 (13.8)	10 (6.9)	23 (15.9)	13 (9.0)	1 (0.7)	6 (4.1)	4 (2.8)	4 (2.8)	7 (4.8)	1 (0.7)	3 (2.1)	1 (0.7)	3 (2.1)	145 (100.0)	4	149	114.29	128.96
100～ (%)	91 (10.5)	101 (11.7)	101 (11.7)	123 (14.2)	125 (14.4)	85 (9.8)	54 (6.2)	2 (0.2)	53 (6.1)	26 (3.0)	27 (3.1)	36 (4.2)	14 (1.6)	5 (0.6)	9 (1.0)	14 (1.6)	866 (100.0)	20	886	111.08	157.39
120～ (%)	311 (9.8)	354 (11.2)	320 (10.1)	480 (15.2)	440 (13.9)	361 (11.4)	274 (8.7)	10 (0.3)	172 (5.4)	139 (4.4)	83 (2.6)	100 (3.2)	29 (0.9)	37 (1.2)	24 (0.8)	30 (0.9)	3,164 (100.0)	88	3,252	104.82	110.71
140～ (%)	437 (9.1)	563 (11.7)	504 (10.5)	765 (15.9)	682 (14.1)	530 (11.0)	356 (7.4)	8 (0.2)	324 (6.7)	184 (3.8)	143 (3.0)	156 (3.2)	58 (1.2)	27 (0.6)	49 (1.0)	35 (0.7)	4,821 (100.0)	140	4,961	102.07	92.78
160～ (%)	312 (9.3)	396 (11.8)	319 (9.5)	520 (15.5)	434 (13.0)	380 (11.4)	256 (7.6)	9 (0.3)	203 (6.1)	156 (4.7)	109 (3.3)	111 (3.3)	49 (1.5)	31 (0.9)	31 (0.9)	31 (0.9)	3,347 (100.0)	104	3,451	107.22	109.97
180～ (%)	139 (10.4)	159 (11.8)	139 (10.4)	214 (15.9)	166 (12.4)	159 (11.8)	85 (6.3)	3 (0.2)	59 (4.4)	73 (5.4)	37 (2.8)	50 (3.7)	25 (1.9)	7 (0.5)	12 (0.9)	15 (1.1)	1,342 (100.0)	31	1,373	104.42	102.64
200～ (%)	22 (7.1)	36 (11.7)	28 (9.1)	50 (16.2)	48 (15.5)	32 (10.4)	24 (7.8)		21 (6.8)	10 (3.2)	11 (3.6)	14 (4.5)	5 (1.6)	4 (1.3)	2 (0.6)	2 (0.6)	309 (100.0)	5	314	107.75	92.18
220～ (%)	6 (12.5)	7 (14.6)	6 (12.5)	9 (18.8)	3 (6.3)	6 (12.5)	2 (4.2)		1 (2.1)	2 (4.2)	2 (4.2)	2 (4.2)	1 (2.1)	1 (2.1)			48 (100.0)	2	50	92.71	85.96
合計 (%)	1,340 (9.5)	1,638 (11.6)	1,432 (10.2)	2,185 (15.5)	1,911 (13.6)	1,579 (11.2)	1,064 (7.6)	33 (0.2)	840 (6.0)	594 (4.2)	416 (3.0)	476 (3.4)	182 (1.3)	115 (0.8)	129 (0.9)	130 (0.9)	14,064 (100.0)	395	14,459	104.87	107.32
記載なし (%)	159 (9.0)	210 (11.9)	181 (10.2)	274 (15.5)	237 (13.4)	208 (11.8)	123 (6.9)	4 (0.2)	94 (5.3)	72 (4.1)	56 (3.2)	50 (2.8)	23 (1.3)	20 (1.1)	23 (1.3)	36 (2.0)	1,770 (100.0)	43	1,813	112.24	123.28
総計 (%)	1,499 (9.5)	1,848 (11.7)	1,613 (10.2)	2,459 (15.5)	2,148 (13.6)	1,787 (11.3)	1,187 (7.5)	37 (0.2)	934 (5.9)	666 (4.2)	472 (3.0)	526 (3.3)	205 (1.3)	135 (0.9)	152 (1.0)	166 (1.0)	15,834 (100.0)	438	16,272	105.70	109.24
平均	151.11	151.84	151.07	152.09	151.21	151.68	150.91	148.88	151.01	154.12	152.47	151.84	155.63	150.97	151.40	149.22	151.63	150.95	151.61		
標準偏差	24.11	23.62	23.37	23.33	22.85	23.57	22.45	23.96	22.65	22.84	23.65	24.61	24.64	25.43	24.03	25.62	23.40	22.29	23.37		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査