

表 3637 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	15	21	70	257	914	3,383	7,928	7,485	3,022	900	415	24,410	784	25,194	10.93	1.29
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(1.1)	(3.7)	(13.9)	(32.5)	(30.7)	(12.4)	(3.7)	(1.7)	(100.0)				
女性	11	10	44	188	723	2,467	5,019	4,092	1,360	285	108	14,307	445	14,752	10.69	1.21
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(1.3)	(5.1)	(17.2)	(35.1)	(28.6)	(9.5)	(2.0)	(0.8)	(100.0)				
合計	26	31	114	445	1,637	5,850	12,947	11,577	4,382	1,185	523	38,717	1,229	39,946	10.84	1.26
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(1.1)	(4.2)	(15.1)	(33.4)	(29.9)	(11.3)	(3.1)	(1.4)	(100.0)				
記載なし																
(%)																
総計	26	31	114	445	1,637	5,850	12,947	11,577	4,382	1,185	523	38,717	1,229	39,946	10.84	1.26
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(1.1)	(4.2)	(15.1)	(33.4)	(29.9)	(11.3)	(3.1)	(1.4)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査