

表 3647 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 透析前拡張期血圧(mmHg)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前拡張期血圧	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)						1 (16.7)	3 (50.0)	2 (33.3)				6 (100.0)	1	7	10.83	0.76
20～ (%)			4 (3.3)	5 (4.1)	10 (8.3)	24 (19.8)	33 (27.3)	30 (24.8)	9 (7.4)	3 (2.5)	3 (2.5)	121 (100.0)		121	10.39	1.62
40～ (%)		4 (0.2)	22 (0.8)	72 (2.7)	181 (6.9)	508 (19.2)	852 (32.2)	660 (25.0)	258 (9.8)	58 (2.2)	27 (1.0)	2,642 (100.0)	38	2,680	10.56	1.36
60～ (%)	10 (0.1)	17 (0.1)	45 (0.3)	182 (1.2)	717 (4.8)	2,365 (16.0)	5,047 (34.1)	4,320 (29.2)	1,536 (10.4)	400 (2.7)	164 (1.1)	14,803 (100.0)	169	14,972	10.77	1.26
80～ (%)	6 (0.1)	5 (0.1)	16 (0.2)	76 (0.9)	315 (3.5)	1,305 (14.7)	2,987 (33.5)	2,777 (31.2)	1,047 (11.8)	262 (2.9)	111 (1.2)	8,907 (100.0)	96	9,003	10.89	1.21
90～ (%)	4 (0.1)	2 (0.0)	12 (0.2)	34 (0.6)	151 (2.9)	672 (12.7)	1,777 (33.7)	1,670 (31.6)	677 (12.8)	196 (3.7)	84 (1.6)	5,279 (100.0)	38	5,317	10.98	1.22
100～ (%)	3 (0.1)	1 (0.0)	5 (0.2)	25 (0.9)	76 (2.8)	334 (12.5)	852 (31.9)	847 (31.7)	360 (13.5)	114 (4.3)	54 (2.0)	2,671 (100.0)	30	2,701	11.03	1.28
120～ (%)					6 (3.6)	18 (10.7)	57 (33.9)	53 (31.5)	19 (11.3)	9 (5.4)	6 (3.6)	168 (100.0)	1	169	11.16	1.31
140～ (%)				1 (9.1)	1 (9.1)	1 (9.1)	4 (36.4)	3 (27.3)	1 (9.1)			11 (100.0)	1	12	10.60	1.39
合計 (%)	23 (0.1)	29 (0.1)	104 (0.3)	395 (1.1)	1,457 (4.2)	5,228 (15.1)	11,612 (33.6)	10,362 (29.9)	3,907 (11.3)	1,042 (3.0)	449 (1.3)	34,608 (100.0)	374	34,982	10.84	1.26
記載なし (%)	3 (0.1)	2 (0.0)	10 (0.2)	50 (1.2)	180 (4.4)	622 (15.1)	1,335 (32.5)	1,215 (29.6)	475 (11.6)	143 (3.5)	74 (1.8)	4,109 (100.0)	855	4,964	10.87	1.30
総計 (%)	26 (0.1)	31 (0.1)	114 (0.3)	445 (1.1)	1,637 (4.2)	5,850 (15.1)	12,947 (33.4)	11,577 (29.9)	4,382 (11.3)	1,185 (3.1)	523 (1.4)	38,717 (100.0)	1,229	39,946	10.84	1.26
平均	82.48	71.97	71.09	73.38	75.32	77.32	79.17	80.05	80.61	82.02	82.43	79.19	77.49	79.17		
標準偏差	12.98	12.72	17.35	16.35	15.17	14.72	14.42	14.45	14.69	15.06	15.46	14.69	15.87	14.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査