

表 3648 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL) 透析前脈拍(拍/分)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前脈拍	5未満	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)				1 (5.9)		3 (17.6)	6 (35.3)	5 (29.4)			2 (11.8)	17 (100.0)		17	10.79	1.72
40～ (%)				4 (1.4)	11 (3.8)	50 (17.1)	98 (33.6)	85 (29.1)	31 (10.6)	10 (3.4)	3 (1.0)	292 (100.0)	3	295	10.81	1.19
50～ (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.2)	24 (0.9)	109 (4.2)	426 (16.4)	828 (31.8)	847 (32.5)	274 (10.5)	64 (2.5)	25 (1.0)	2,603 (100.0)	29	2,632	10.81	1.20
60～ (%)	5 (0.1)	5 (0.1)	20 (0.2)	85 (1.0)	303 (3.6)	1,282 (15.2)	2,876 (34.2)	2,560 (30.4)	964 (11.4)	240 (2.9)	81 (1.0)	8,421 (100.0)	69	8,490	10.84	1.21
70～ (%)	6 (0.1)	11 (0.1)	26 (0.2)	106 (1.0)	463 (4.4)	1,545 (14.8)	3,570 (34.2)	3,132 (30.0)	1,178 (11.3)	292 (2.8)	121 (1.2)	10,450 (100.0)	95	10,545	10.82	1.24
80～ (%)	6 (0.1)	6 (0.1)	28 (0.4)	100 (1.4)	291 (4.2)	1,062 (15.2)	2,352 (33.7)	2,018 (28.9)	791 (11.3)	216 (3.1)	105 (1.5)	6,975 (100.0)	88	7,063	10.83	1.29
90～ (%)	5 (0.2)	4 (0.1)	13 (0.4)	50 (1.5)	150 (4.6)	509 (15.6)	1,042 (32.0)	906 (27.8)	382 (11.7)	133 (4.1)	63 (1.9)	3,257 (100.0)	36	3,293	10.85	1.36
100～ (%)		1 (0.1)	5 (0.5)	11 (1.1)	58 (5.6)	161 (15.6)	322 (31.3)	303 (29.4)	102 (9.9)	44 (4.3)	23 (2.2)	1,030 (100.0)	12	1,042	10.85	1.37
110～ (%)			3 (1.2)	4 (1.6)	16 (6.3)	33 (12.9)	71 (27.8)	83 (32.5)	35 (13.7)	6 (2.4)	4 (1.6)	255 (100.0)	6	261	10.87	1.47
120～ (%)				2 (1.9)	4 (3.8)	15 (14.3)	35 (33.3)	36 (34.3)	9 (8.6)	4 (3.8)		105 (100.0)	1	106	10.80	1.19
合計 (%)	23 (0.1)	28 (0.1)	99 (0.3)	387 (1.2)	1,405 (4.2)	5,086 (15.2)	11,200 (33.5)	9,975 (29.9)	3,766 (11.3)	1,009 (3.0)	427 (1.3)	33,405 (100.0)	339	33,744	10.83	1.26
記載なし (%)	3 (0.1)	3 (0.1)	15 (0.3)	58 (1.1)	232 (4.4)	764 (14.4)	1,747 (32.9)	1,602 (30.2)	616 (11.6)	176 (3.3)	96 (1.8)	5,312 (100.0)	890	6,202	10.88	1.29
総計 (%)	26 (0.1)	31 (0.1)	114 (0.3)	445 (1.1)	1,637 (4.2)	5,850 (15.1)	12,947 (33.4)	11,577 (29.9)	4,382 (11.3)	1,185 (3.1)	523 (1.4)	38,717 (100.0)	1,229	39,946	10.84	1.26
平均	78.52	79.36	79.35	77.07	76.41	75.30	75.22	75.11	75.54	76.89	78.23	75.41	76.88	75.43		
標準偏差	12.12	12.10	13.67	13.52	13.37	13.03	12.67	13.00	12.80	13.34	13.18	12.92	14.05	12.93		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査