

表 3664 総コレステロール濃度(mg/dL) 性別 (透析患者全体)

性別	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	6,497	18,146	31,268	32,383	23,735	12,953	6,067	2,414	838	546	134,847	63,294	198,141	149.09	33.38
(%)	(4.8)	(13.5)	(23.2)	(24.0)	(17.6)	(9.6)	(4.5)	(1.8)	(0.6)	(0.4)	(100.0)				
女性	1,333	4,576	10,933	16,276	16,508	12,572	7,656	3,657	1,562	1,040	76,113	35,854	111,967	167.86	36.62
(%)	(1.8)	(6.0)	(14.4)	(21.4)	(21.7)	(16.5)	(10.1)	(4.8)	(2.1)	(1.4)	(100.0)				
合計	7,830	22,722	42,201	48,659	40,243	25,525	13,723	6,071	2,400	1,586	210,960	99,148	310,108	155.86	35.74
(%)	(3.7)	(10.8)	(20.0)	(23.1)	(19.1)	(12.1)	(6.5)	(2.9)	(1.1)	(0.8)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	7,830	22,722	42,201	48,659	40,243	25,525	13,723	6,071	2,400	1,586	210,960	99,148	310,108	155.86	35.74
(%)	(3.7)	(10.8)	(20.0)	(23.1)	(19.1)	(12.1)	(6.5)	(2.9)	(1.1)	(0.8)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査