

表 3700 総コレステロール濃度(mg/dL) 原疾患別(腹膜透析患者)

原疾患	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	14 (0.9)	41 (2.6)	141 (9.1)	285 (18.3)	309 (19.8)	309 (19.8)	224 (14.4)	121 (7.8)	65 (4.2)	49 (3.1)	1,558 (100.0)	1,501	3,059	181.43	39.21
慢性腎盂腎炎 (%)		1 (2.2)	3 (6.5)	7 (15.2)	9 (19.6)	9 (19.6)	9 (19.6)	3 (6.5)	1 (2.2)	4 (8.7)	46 (100.0)	47	93	191.72	43.15
急速進行性糸球 体腎炎 (%)		1 (3.1)		2 (6.3)	5 (15.6)	12 (37.5)	3 (9.4)	2 (6.3)	2 (6.3)	5 (15.6)	32 (100.0)	42	74	204.72	50.01
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)			1 (5.9)	2 (11.8)	4 (23.5)	4 (23.5)		4 (23.5)	1 (5.9)	1 (5.9)	17 (100.0)	15	32	196.82	48.34
その他の分類不 能の腎炎 (%)			3 (7.0)	4 (9.3)	10 (23.3)	12 (27.9)	9 (20.9)	2 (4.7)	1 (2.3)	2 (4.7)	43 (100.0)	42	85	189.74	37.92
多発性嚢胞腎 (%)	1 (0.8)	2 (1.6)	8 (6.6)	24 (19.7)	28 (23.0)	22 (18.0)	15 (12.3)	17 (13.9)	2 (1.6)	3 (2.5)	122 (100.0)	121	243	182.07	36.16
腎硬化症 (%)	4 (0.8)	16 (3.0)	43 (8.1)	92 (17.3)	111 (20.9)	112 (21.1)	70 (13.2)	42 (7.9)	22 (4.1)	20 (3.8)	532 (100.0)	551	1,083	182.36	39.03
悪性高血圧 (%)		2 (4.4)	9 (20.0)	8 (17.8)	4 (8.9)	8 (17.8)	7 (15.6)	7 (15.6)			45 (100.0)	62	107	175.67	37.24
糖尿病性腎症 (%)	23 (1.8)	75 (5.8)	180 (13.9)	281 (21.7)	260 (20.1)	197 (15.2)	138 (10.7)	64 (5.0)	39 (3.0)	35 (2.7)	1,292 (100.0)	1,474	2,766	170.49	40.08
SLE腎炎 (%)	1 (2.9)		4 (11.8)	3 (8.8)	8 (23.5)	2 (5.9)	5 (14.7)	5 (14.7)	2 (5.9)	4 (11.8)	34 (100.0)	28	62	199.15	64.49
アミロイド腎 (%)							1 (100.0)				1 (100.0)	8	9	206.00	
痛風腎 (%)				6 (28.6)	4 (19.0)	4 (19.0)	1 (4.8)	5 (23.8)		1 (4.8)	21 (100.0)	12	33	190.10	38.24
先天性代謝異常 による腎不全 (%)		1 (9.1)	2 (18.2)	2 (18.2)	2 (18.2)	1 (9.1)	1 (9.1)	1 (9.1)		1 (9.1)	11 (100.0)	7	18	182.82	70.55
腎・尿路結核 (%)							1 (100.0)				1 (100.0)		1	213.00	
腎・尿路結石 (%)						2 (50.0)	2 (50.0)				4 (100.0)	12	16	197.00	12.99
腎・尿路腫瘍 (%)			1 (25.0)		1 (25.0)		2 (50.0)				4 (100.0)	10	14	178.25	40.93
閉塞性尿路障害 (%)	1 (9.1)		2 (18.2)	1 (9.1)	1 (9.1)	2 (18.2)	2 (18.2)		1 (9.1)	1 (9.1)	11 (100.0)	11	22	187.09	70.65
骨髄腫 (%)				1 (33.3)	1 (33.3)		1 (33.3)				3 (100.0)	5	8	173.67	36.23
腎形成不全 (%)		3 (8.3)	6 (16.7)	4 (11.1)	5 (13.9)	8 (22.2)	5 (13.9)	4 (11.1)		1 (2.8)	36 (100.0)	40	76	174.42	38.63
不明 (%)		9 (2.3)	31 (7.9)	62 (15.9)	79 (20.3)	96 (24.6)	50 (12.8)	32 (8.2)	18 (4.6)	13 (3.3)	390 (100.0)	450	840	183.75	35.95
再導入 (%)	1 (3.2)	4 (12.9)	4 (12.9)	5 (16.1)	6 (19.4)	5 (16.1)	2 (6.5)	2 (6.5)	1 (3.2)	1 (3.2)	31 (100.0)	20	51	171.81	57.00
その他 (%)	5 (4.2)	5 (4.2)	10 (8.5)	17 (14.4)	18 (15.3)	28 (23.7)	16 (13.6)	7 (5.9)	4 (3.4)	8 (6.8)	118 (100.0)	131	249	182.77	49.34
合計 (%)	50 (1.1)	160 (3.7)	448 (10.3)	806 (18.5)	865 (19.9)	833 (19.1)	564 (13.0)	318 (7.3)	159 (3.7)	149 (3.4)	4,352 (100.0)	4,589	8,941	179.01	40.54
記載なし (%)															
総計 (%)	50 (1.1)	160 (3.7)	448 (10.3)	806 (18.5)	865 (19.9)	833 (19.1)	564 (13.0)	318 (7.3)	159 (3.7)	149 (3.4)	4,352 (100.0)	4,589	8,941	179.01	40.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査