

表 3706 総コレステロール濃度(mg/dL) 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												1	1		
20～ (%)		1 (8.3)	2 (16.7)	1 (8.3)	4 (33.3)	1 (8.3)	1 (8.3)			2 (16.7)	12 (100.0)	3	15	186.67	69.64
40～ (%)	7 (2.4)	17 (5.9)	38 (13.1)	55 (19.0)	50 (17.3)	41 (14.2)	44 (15.2)	21 (7.3)	10 (3.5)	6 (2.1)	289 (100.0)	86	375	173.64	42.99
60～ (%)	19 (1.2)	64 (3.9)	182 (11.2)	316 (19.5)	324 (20.0)	321 (19.8)	190 (11.7)	95 (5.9)	55 (3.4)	57 (3.5)	1,623 (100.0)	442	2,065	176.84	40.64
80～ (%)	8 (0.8)	29 (2.8)	103 (10.1)	196 (19.2)	198 (19.4)	197 (19.3)	142 (13.9)	92 (9.0)	26 (2.5)	31 (3.0)	1,022 (100.0)	274	1,296	179.75	37.76
90～ (%)	5 (0.9)	19 (3.5)	57 (10.5)	96 (17.7)	105 (19.4)	102 (18.9)	71 (13.1)	44 (8.1)	24 (4.4)	18 (3.3)	541 (100.0)	173	714	180.26	41.14
100～ (%)	2 (0.7)	13 (4.9)	20 (7.5)	32 (12.0)	57 (21.3)	52 (19.5)	40 (15.0)	27 (10.1)	16 (6.0)	8 (3.0)	267 (100.0)	80	347	184.97	39.72
120～ (%)			4 (26.7)	1 (6.7)	3 (20.0)	1 (6.7)	2 (13.3)	2 (13.3)	2 (13.3)		15 (100.0)	3	18	181.60	41.71
140～ (%)												1	1		
合計 (%)	41 (1.1)	143 (3.8)	406 (10.8)	697 (18.5)	741 (19.7)	715 (19.0)	490 (13.0)	281 (7.5)	133 (3.5)	122 (3.2)	3,769 (100.0)	1,063	4,832	178.50	40.25
記載なし (%)	9 (1.5)	17 (2.9)	42 (7.2)	109 (18.7)	124 (21.3)	118 (20.2)	74 (12.7)	37 (6.3)	26 (4.5)	27 (4.6)	583 (100.0)	3,526	4,109	182.31	42.22
総計 (%)	50 (1.1)	160 (3.7)	448 (10.3)	806 (18.5)	865 (19.9)	833 (19.1)	564 (13.0)	318 (7.3)	159 (3.7)	149 (3.4)	4,352 (100.0)	4,589	8,941	179.01	40.54
平均	74.59	76.73	77.63	78.03	79.18	79.58	79.36	81.16	80.94	78.64	78.95	79.25	79.01		
標準偏差	14.45	15.71	14.88	13.44	14.37	13.53	14.66	14.91	16.83	14.45	14.37	14.67	14.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査