

表 3707 総コレステロール濃度(mg/dL) 脈拍(拍/分)別 (腹膜透析患者)

脈拍	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)				1 (33.3)		2 (66.7)					3 (100.0)	2	5	175.00	13.89
40～ (%)		1 (4.3)	6 (26.1)	5 (21.7)	4 (17.4)	4 (17.4)	2 (8.7)	1 (4.3)			23 (100.0)	2	25	160.17	33.33
50～ (%)	4 (2.7)	5 (3.4)	20 (13.6)	35 (23.8)	34 (23.1)	22 (15.0)	18 (12.2)	5 (3.4)	2 (1.4)	2 (1.4)	147 (100.0)	40	187	168.20	35.65
60～ (%)	11 (1.6)	35 (5.2)	81 (11.9)	142 (20.9)	132 (19.5)	123 (18.1)	74 (10.9)	44 (6.5)	18 (2.7)	18 (2.7)	678 (100.0)	172	850	173.28	40.45
70～ (%)	9 (0.9)	41 (3.9)	120 (11.6)	208 (20.0)	213 (20.5)	184 (17.7)	124 (11.9)	79 (7.6)	31 (3.0)	29 (2.8)	1,038 (100.0)	233	1,271	176.69	40.09
80～ (%)	10 (1.2)	30 (3.7)	82 (10.0)	134 (16.3)	158 (19.2)	181 (22.0)	113 (13.8)	57 (6.9)	32 (3.9)	24 (2.9)	821 (100.0)	203	1,024	179.70	38.94
90～ (%)	4 (1.1)	10 (2.8)	33 (9.1)	60 (16.5)	76 (20.9)	70 (19.3)	51 (14.0)	25 (6.9)	16 (4.4)	18 (5.0)	363 (100.0)	118	481	182.53	40.19
100～ (%)	2 (1.2)	6 (3.7)	12 (7.4)	23 (14.2)	29 (17.9)	32 (19.8)	23 (14.2)	16 (9.9)	9 (5.6)	10 (6.2)	162 (100.0)	42	204	187.81	45.95
110～ (%)		1 (2.7)	5 (13.5)	3 (8.1)	7 (18.9)	7 (18.9)	4 (10.8)	2 (5.4)	3 (8.1)	5 (13.5)	37 (100.0)	15	52	194.70	49.20
120～ (%)		1 (7.7)	2 (15.4)		4 (30.8)	2 (15.4)	2 (15.4)		2 (15.4)		13 (100.0)	7	20	180.46	43.60
合計 (%)	40 (1.2)	130 (4.0)	361 (11.0)	611 (18.6)	657 (20.0)	627 (19.1)	411 (12.5)	229 (7.0)	113 (3.4)	106 (3.2)	3,285 (100.0)	834	4,119	177.65	40.31
記載なし (%)	10 (0.9)	30 (2.8)	87 (8.2)	195 (18.3)	208 (19.5)	206 (19.3)	153 (14.3)	89 (8.3)	46 (4.3)	43 (4.0)	1,067 (100.0)	3,755	4,822	183.19	40.95
総計 (%)	50 (1.1)	160 (3.7)	448 (10.3)	806 (18.5)	865 (19.9)	833 (19.1)	564 (13.0)	318 (7.3)	159 (3.7)	149 (3.4)	4,352 (100.0)	4,589	8,941	179.01	40.54
平均	75.47	76.66	76.26	75.95	77.72	78.56	78.82	78.84	82.27	82.18	77.84	79.07	78.09		
標準偏差	13.08	12.84	13.23	12.35	13.08	13.20	13.05	12.52	14.49	14.07	13.10	13.86	13.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査